“晟德” 舒坦胃懸乳液 100 毫克/毫升 (斯克拉非)

Sucralfate Oral Suspension 100 mg/ml (Sucralfate) “Center”

【成份】: 每 ml 中含

衛署藥製字第 GMP G-9741 048937 號

Sucralfate ..... 100 mg

【作用機轉】: (依文獻記載)

主成份 Sucralfate 就化學性質而言，是一種蔗糖八硫酸鹼性鋁鹽 (Basic Aluminum Salt of Sucrose Octa-sulfate)。

從實驗數據上得知，sucralfate 之所以能治療潰瘍，是由於此劑具細胞保護的作用。當口服時，於胃內的強酸下，Sucralfate 會變為帶有多個陰離子且具高度黏著性的物質。而在潰瘍區域的黏膜由於細胞質滲出物及細胞碎片的堆積，造成有豐富蛋白質的區域。Sucralfate 的多個陰離子為負電，而集中於潰瘍區域的蛋白質為正電，故在 Sucralfate 與潰瘍區域之間形成多價鍵結。此即為 Sucralfate 之所以有選擇性與潰瘍區域作用的機轉。除此之外，並可形成一層具黏著性的保護膜包在潰瘍傷口處，而具有三重功能可增強細胞保護障礙。

【作用特性】: (依文獻記載)

一. Sucralfate 於強酸下能高度選擇性的吸附在破損的胃腸黏膜上，形成一種具三重功能的胃腸保護層。

1. 抗滲透性之保護層: 阻止胃酸及胃蛋白酶滲入潰瘍黏膜區之刺激作用。
2. 抗消化性之保護層: 保護新黏膜細胞避免被胃蛋白酶分解。
3. 抗崩解性之保護層: 抵抗膽汁、酒精、阿斯匹林或其他抗發炎藥劑之崩解新黏膜細胞。

二. Sucralfate 是一種非全身性的藥物，口服後幾乎有 95%的藥物仍留於胃腸道，所以在胃腸道僅少量被吸收。

【適應症】:

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道潰瘍、逆流性食道炎。

【用法用量】:

本藥須由醫師處方使用。

一日四次，每次 10 ml，空腹時使用(飯前半小時服用)。

【注意事項】: (依文獻記載)

(1) 服用時儘可能在空腹時進行，大約於進餐前半小時服用。

(2) 本品功能是在強酸下方能達到最佳療效，因此若欲與制酸劑或減少胃酸分泌之藥物 (如 : H_2 - 組織胺接受體拮抗劑) 併用，則兩者服用的時間至少需間隔 30-60 分鐘之久。

【副作用】: (依文獻記載)

胃腸偶爾出現便秘的現象。

【貯存條件】:

(1) 本品應置於兒童不及之處。

(2) 請密封保存於 25℃ 以下，請勿冰存並避免陽光直射。

【包裝】:

4000 ml 以下塑膠瓶裝。

【製 造 廠】:

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.
廠　　址: 新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 2 號
公司電話: (02) 2547-4332　　圖文傳真: (02)2545-3562
工廠電話: (03) 598-1829　　圖文傳真: (03) 598-1820