

膽道疾患治療劑

利鎮膽膠囊

Limecro Capsules

(Hymecromone製劑)

利鎮膽膠囊為Hymecromone製劑，有緩和而持續的利膽作用，對Oddi氏括約肌有選擇性之鎮痙作用，能調整膽道機能，對膽道疾患所引起之各種症狀，有改善之效果。

【組成·性狀】《依文獻記載》

利鎮膽膠囊為膠囊劑，每一粒膠囊中含200mg之Hymecromone。

Hymecromone為白色結晶或結晶性粉末，無嗅、無味，易溶於二甲基乙醯胺、吡啶，微溶於甲醇、乙醇及丙酮，幾乎不溶於水。其構造式如下：


一般名：Hymecromone

化學式：7-Hydroxy-4-methyl Coumarin

分子式：C₁₀H₈O₃

分子量：176.17

熔點：187~191°C

**【賦形劑】**

lactose, magnesium stearate, talc.

Coating:

FD&C Blue No.1, FD&C Yellow No.5, FD&C Yellow No.6, Food Red No.6, gelatin, sodium lauryl sulfate, titanium dioxide.

【作用】《依文獻記載》

- 1.對膽道組織有特異性的鎮痙作用，能弛緩Oddi氏括約肌，有調節膽囊、膽機能之作用。
- 2.有緩和而持續性之催膽作用。

【毒性】《依文獻記載》

1.急性毒性

經口LD₅₀：dd系小白鼠3150mg/kg (♂) 2850mg/kg (♀)

Wistar系大白鼠4100mg/kg (♂) 3850mg/kg (♀)

2.亞急性、慢性毒性

dd系雌雄小白鼠連續5週及26週強制口服本劑，實施一般症狀、體重及飼料、給水量之測定、血液檢查、肝機能檢查、主要器官之重量測定及病理學檢查發現無異常。

3.催畸型性

ICR-JCL系小白鼠及Wistar系大白鼠經口服用本劑後，母體、胎鼠、新生鼠均無影響。

【適應症】

下列諸症之利膽及鎮痙作用：膽石、膽囊炎、膽道阻礙、膽囊切除後症候群。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

通常成人一次2粒膠囊，每日3次，經口服用。

依年齡、症狀，作適宜之增減。

【使用上之注意】《依文獻記載》

- 1.胃腸：有時食慾不振、噁心、嘔吐、膨滿感、腹痛、軟便、下痢、結痢、便秘。
- 2.其他：有時發疹、搔癢感、發熱、倦態感、唾液分泌過多、頭重感、眩暈。

【包裝】

12-1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【貯存】

於25°C以下乾燥處貯存。

委託者：瑩碩生技醫藥股份有限公司

地 址：臺北市南京東路二段206號8樓之3

製造廠：十全實業股份有限公司

地 址：南投縣南投市南崗工業區仁和路27號