cGMP 藥品 “派頓” **克樂敏眼藥水 2%** 衛署藥製字第 G-10034 049351 號

Comolyn Ophthalmic Solution 2% “Patron”

【成　　分】：Each ml contains：Cromolyn sodium……20.0mg

【賦 形 劑】：E.D.T.A. Disodium, Tween 80, Benzalkonium Chloride, Sodium Chloride, Purified Water.

【作　　用】：本點眼液劑係一抗眼睛過敏之局部用藥。

【適 應 症】：過敏性結膜炎。

【用法用量】：每天點眼 4 次，每次各點一滴於雙眼。如因使用本品後症狀加劇，需立即停藥就醫。點藥時，頭向後養傾，將下眼瞼向下拉，眼向上看，並點入藥水一滴於結膜囊內(眼睛及眼瞼之間的部位)，輕闔雙眼數秒鐘即可張開。

由於本品係一無菌溶液，必須遵循下述原則使用：

1. 避免與他人共用一瓶。
2. 點藥時應保持高度清潔衛生並避免碰觸瓶口。
3. 每次使用後須將瓶蓋關緊。
4. 治療完成後，需丟棄尚未用完之藥品。

【類　　別】：本藥須由醫師處方使用。

【禁　　忌】：

已知對本產品之任一成分過敏者禁用。

【注意事項】：

勿超過建議劑量使用本品。如病情持續或惡化，或使用本品後而產生治療前沒有的症狀如眼睛刺激、麥粒腫或結膜腫脹的現象，則需求教於醫師。

【交互作用】：

尚無資料顯示。然而若與其他藥品併用時，應先徵求醫師或藥師意見。

【警　　告】：

本品因含 Benzalkonium chloride，因此於投藥 20 分鐘以內請勿戴軟式隱形眼鏡。

【孕婦及授乳婦】：

需經醫師評估及確認才能使用於懷孕及授乳期婦女。

【對開車或操作機械時影響】：

尚無資料顯示。

【使用於孩童】：

需先咨詢於醫師。

【藥物過量及處理】：

以建議量局部使用本品，不會發生毒性反應。誤食整瓶的量時亦不會有毒性反應。若不慎大量投與或誤食，請就醫處理。

【副 作 用】：

可能引起眼睛刺痛或刺激感。上述現象通常在投藥初期幾天內即可消失，少數病人會有過敏反應、眼睛腫脹、眼緣乾燥或腫脹(或產生麥粒腫)。若有前述或其他未提及的副作用發生時，則徵詢醫師或藥師意見。

【包　　裝】：100ml 以下塑膠瓶裝。

【貯　　法】：避光 25℃以下貯存。

建議在有效期限前用完，開封一這個月後則丟棄不再使用。

藥品請置於孩童無法取得之處。

PATRON®

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號 TEL：07-6216126