麻膚樂乳膏

Mafuli Cream

衛署藥製字第 049708 號

「主成份」：本品每公克含

Lidocaine	25mg
Prilocaine	25mg

POLYOXYETHYLENE 20 SORBITAN MONOSTEARATE CARBOPOL 940，SODIUM HYDROXIDE，WATER PURIFIED (EQ TO AQUEOUS PURIFIED OR PURIFIED WATER)

「說明」：

本品是由 Lidocaine 及 Prilocaine 以 1.1 比例分散乳化於水相而形成之水包油型乳劑，油相中 Lidocaine 及 Prilocaine 具共融(Eutectic)作用，具有低融點(低於室溫)，因此在表皮局部上是以油液樣進行麻醉作用而優於結晶態者。使用本品後因對血小管之生理影響而會有暫時性皮膚蒼白成潮紅。

「適應症」：

與下列狀況有關之皮膚表面止痛：1.插針，如靜脈注射導管或抽血前。2.表皮外科處置。3.生殖器黏膜，如表皮外科處置前或浸潤麻醉前。

「用法用量」：

1.使用於成人時：先塗敷本品乳膏於欲麻醉處理之完整表皮上使成一厚層，同時可加一覆蓋膠膜或類似之隔絕用薄膜(Occlusive dressing):(1)小外科(Minor)皮膚處理時：如靜脈插針(Cannulation)及穿刺；使用 2.5 克覆於處理部位之 20 至 25cm^2範圍皮膚上，軟膏留置時間需 1 小時以上。(2)較大程度(Major)之皮膚處理時:處理較大面積且較易疼痛之皮膚(如具深度之皮膚移植物之處理)，則使用量應為每 10cm^2面積皮膚上敷覆 2 克乳膏，留置時間應為 2 小時以上。(3)成年男性生殖器皮膚：本品在此處之使用主要是輔助生殖器正式局部麻醉浸潤之導引，使用量為每 10cm^2面積皮膚上敷覆 1 克乳膏，留置時間應為 15 分鐘，卸除乳膏後，正式之局部麻醉浸潤應儘速實施及完成。2.一歲以下的嬰兒使用請參考注意事項。

「副作用」：

1.局部反應：約有 56%病人會出現局部皮膚蒼白、發紅、溫度變化敏感、水腫、發癢、皮疹(rash)現象，但一般症狀輕微且短暫，約在 1 至 2 小時後自然消退。2.過敏反應(Allergic Reaction)：偶會發生蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣、休克等過敏症狀，處理方式可循一般制式處理模式(conventional means)。3.全身性反應(Systemic Reactsons):與一般醯胺類局部麻醉劑所導致之中樞神經興奮或抑制作用及心血管虛脫(Cardiovascular collapse)而產生之循環阻滯.....等症狀相似，通常這些現象乃短暫甚或不致發生的，但較常見的是昏睡致神智不清。

「禁忌症」：

對醯胺類局部麻醉劑過敏者。

「注意事項」：

本品不可用於傷口上、黏膜上、或有異位性皮膚炎患者，並應避免敷在眼睛附近。大範圍或長時間使用於皮膚上(超過用法用量所示)易促進主成分之充分吸收而致嚴重之副作用。除非有進一步的臨床資料，對於孩童使用應加強觀察以下的注意事項：1.早產兒不可使用本品。2.6~12 個月大小孩，同一時間不可使用本品超過 2 個部位。(可參酌"用法用量"中兒童使用之建議劑量表)3.某些藥物(Sulfonamide)可能加重使用本品之患者其變性血紅素血症之形成。

「妊娠與授乳」：

Lidocaine 和 Prilocaine 會分泌至乳汁中，因此授乳婦使用本品時應謹慎注意。

「藥物注意事項」：

請貯存於 25℃以下。

「包裝」：

1000 公克以下塑膠瓶裝

1000 公克以下鋁軟管

本藥限由醫師使用。

委託者:太田藥品股份有限公司
高雄市三民區民族一路 2 巷 27 號 1 樓(07)2238073
製造廠:臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄縣岡山鎮為隨東路 50 號