13X18CM

鎮咳祛痰劑

衛署藥製字第049834號
GMP G-10360

# 依咳停錠

## Eketin Tablets
## (Eprazinone 2HCL)

本劑經由各種實驗顯示具有與磷酸可待因相匹敵之鎮咳作用，但卻無磷酸可待因之成癮性。另對痰所含有之高 DNA 纖維及酸性粘多醣類纖維能產生膨化，離斷及短縮作用，顯示其粘液溶解作用使粘液粘稠度減少，綜括以上作用，使本劑成為一鎮咳祛痰製劑。

【組　　成】
每錠含
Eprazinone Dihydrochloride ····· 50mg
Lactose-DT.....0.04g
Avicel.....0.027g
Magnesium Stearate.....0.003g

【適　應　症】
鎮咳、祛痰(支氣管擴張、支氣管氣喘、急慢性支氣管炎、上氣道炎、感冒。)

【用法用量】
成人：每天3次，每次1~2錠
兒童：依體重酌減用量
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】
(1)副作用
(a)過敏症：有過敏症狀出現時應停止服用。
(b)腸胃症：食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不快感、腹痛。
(c)其　他：偶有頭痛。
(2)孕婦：授乳婦使用本劑之安全性尚未確立。應斟酌治療上之利弊危險性作一判斷選擇。

包裝:1000錠以下PE塑膠瓶裝及PTP鋁箔盒裝
儲存:室溫下儲藏(25°C以下儲藏)

委託者:昇通藥品股份有限公司　地址:彰化縣員林市浮圳里浮圳巷4號之2
製造廠:新喜國際企業股份有限公司
台南縣鹽水鎮孫厝里4-6號