

適痙定錠

SPASMOTIN Tablets “Sinphar”

—— 抗膽鹼劑 ——

胃、十二指腸潰瘍常併發副交感神經(迷走神經)機能亢進之症狀發生。Hyoscyamine sulfate乃莨菪生物鹼中之主要抗膽鹼/抗痙攣劑，對副交感神經節之傳導具遮斷作用，對胃腸道、膽道、尿路等之鎮痙作用，具顯著之效果。

成分：每錠含：
Hyoscyamine sulfate.....0.125mg

賦形劑：Corn Starch、Lactose Monohydrate、Microcrystalline Cellulose、Sucralose、Acacia Powder、Peppermint、Stearic Acid、Water Purified.

作用：

- 1.本藥可專一性抑制乙醯膽鹼於神經節後膽素性神經及於平滑肌之作用。而未稍膽素性接受體則廣存於平滑肌、心肌、竇房結、房室竇及外分泌腺，在治療劑量下，本藥並不作用於自主神經之上。
- 2.Hyoscyamine能抑制胃腸道之運動性並降低胃酸之分泌作用。另外，本藥亦能控制咽部、氣管及支氣管之過度分泌作用。
- 3.Hyoscyamine以口服及舌下給藥均能迅速而完全地被吸收，並分佈至全身，半衰期為2~3.5小時。
- 4.Hyoscyamine於體內可部份被水解成tropic acid及tropine，而主要藥物於12小時內以原形方式排泄於尿中，僅微量藥物出現於乳汁中。Hyoscyamine能通過血液腦障壁及胎盤。
- 5.本藥到達最高血中濃度時間約4小時，血漿排泄半衰期約9小時。

適應症：

下列疾患之痙攣及運動機能亢進、胃潰瘍、胃酸分泌過多、內臟痙攣、痙攣性結腸炎、膀胱炎、幽門痙攣、妊娠嘔吐、腎痙痛、膽痙痛、痛經。

用法用量：

成人及12歲以上兒童：一次1~2錠，每4小時或需要時一次，每日不超過12錠。

2~12歲兒童：一次1/2~1錠，每4小時或需要時一次，每日不超過6錠。視症狀及嚴重度調整劑量。

禁忌症：

青光眼、阻塞性尿路症狀(如前列腺肥大導致膀胱頸阻塞)、胃腸道阻塞症狀(如弛緩不能、幽門十二指腸道狹窄)、麻痺性腸阻塞、老年人或衰弱患者之小腸張力缺乏、急性出血之不穩定性心血管狀態、嚴重潰瘍性結腸炎、毒性巨腸症併發之潰瘍性結腸炎及重症肌無力之患者禁用本藥。

警語：

- 1.處於高溫環境下之患者應謹慎給藥(如發熱及熱中風導致排汗降低)。
- 2.不完全腸道阻塞患者可能出現下痢情形，尤其是接受迴腸造口術或結腸造口術之患者。
- 3.與其他抗膽鹼性藥物相似，Hyoscyamine可能導致嗜睡、眩暈或複視等，另外需留心操作機械及開車等危險工作。
- 4.使用本藥時，針對部份敏感患者可能出現精神神經系統方面症狀，如混亂、無方向感、短暫性記憶消失、幻覺、發音困難、運動失調、昏迷、欣快、焦慮感減低、疲勞、失眠、不安及不適當之情緒反應，症狀通常於停藥後12~48小時內即可消失。

注意事項：

- 1.下列患者應謹慎用藥：自主神經疾患者，甲狀腺機能亢進、冠心病、鬱血性心衰竭、心律不整、高血壓及腎臟疾病患者。
- 2.使用抗膽鹼性藥物前應檢查患者有否心跳過速現象以避免藥物可能造成心跳加速之現象。
- 3.本藥於罹患裂孔性疝氣併逆流性食道炎患者應小心用藥。
- 4.交互作用：
 - (1)與下述藥物併用時可能加重下列藥物副作用之發生，如抗蕈素性藥物、amantadine, haloperidol, phenothiazines, MAOI, tricyclic antidepressants或某些抗組織胺劑。
 - (2)因制酸劑可能干擾本藥之吸收，故本藥應於餐前服用，而制酸劑則於飯後服用。
- 5.尚無長期研究動物使用Hyoscyamine之致癌，致突變及生育缺陷之報告，另外，Hyoscyamine 40年以上之臨床經驗亦無此方面之報導。

孕婦、授乳婦之投與：

動物生殖試驗並無不良影響。本藥使用於孕婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女，宜先權衡治療之必要性方始投與。

Hyoscyamine會分泌於乳汁中，因此，授乳婦應謹慎使用。

副作用：

與其他抗膽鹼/抗痙攣劑相似，下述症狀可能出現於少數患者，包括口乾、尿液滯留、複視、心跳過速、心悸、瞳孔放大、睫狀肌麻痺、視覺張力增加、味覺喪失、頭痛、神經質、嗜睡、虛弱、眩暈、失眠、噁心、嘔吐、陽萎、乳汁減少、便秘、脹氣、特異體質之過敏反應、蕁麻疹、運動失調、睡眠困難、混亂或興奮及減少排汗等。

過量與治療：

過量時症狀如，頭痛、噁心、嘔吐、複視、散瞳、皮膚躁乾，眩暈，口乾、吞嚥困難及中樞神經症狀等。

治療：立即洗胃並靜脈注射0.5~2 mg physostigmine，必要時，可重複給藥至5mg。發熱時施以症狀治療(溫水浴等)。

貯藏：30℃以下室溫儲存，避免日光直射及受潮，並置放於兒童不易取得之處。

包裝：12~1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 050179號
G-10625號



® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website: <http://www.sinphar.com>