綜合感冒治療劑

“長安”綜合感冒咳嗽膠囊

Zuanhocanmon Kosou Capsules "C.A."　（香檳口味）

【成　　分】 Each Capsule Contains：

有效成分及含量：

Codeine Phosphate	6 mg
Acetaminophen	300 mg
Guaifenesin	83 mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride	10 mg
Chlorpheniramine Maleate	2 mg

其他成分(賦形劑)：Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Champagne(Flavor), Magnesium Stearate, Capsule(Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Water Purified, Glycerin, Sunset Yellow FCF, New Coccine).

【用 途(適 應 症)】 感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一)6歲以下。
(二)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
(三)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性支氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
(四)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
(五)有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、 止痛或退燒等藥品。
(三)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
(四)服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)不要服用超過建議劑量。
(四)不要服用本藥超過七日。
(五)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
(六)酒精警語:不得併服含酒精飲料,因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
(七)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
(八)不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

年　齡	劑　量
成人及15歲以上	一天三次，一次一粒，飯後服用

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身 體 部 位	副 作 用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)若有任何不適情形產生。
(二)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
(三)症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
(四)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
(五)服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]， 或服藥後出現下列症狀:胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
(六)有過敏情形，例如:臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、 蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】6-1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】請置於緊密容器內，並於25℃以下避光儲存。

衛署藥製字第 G-10647　050211號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路19號、19-1號