

“長安”綜合感冒咳嗽膠囊

Zuanhocannon Kosou Capsules "C. A."

(鳳梨口味)

【成分】 Each Capsule Contains :

有效成分及含量： Codeine Phosphate ..... 6 mg  
 Acetaminophen .....300 mg  
 Guaifenesin ..... 83 mg  
 DL-Methylephedrine Hydrochloride .....10 mg  
 Chlorpheniramine Maleate .....2 mg

其他成分(賦形劑)： Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Pineapple Flavor, Magnesium Stearate, Capsule(Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Water Purified, Glycerin, Sunset Yellow FCF, New Coccine).

【用途(適應症)】 感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：  
 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一) 6歲以下。
  - (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  - (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性支氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
  - (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
  - (五) 有心臟病及65歲以上的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
  - (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 不要服用超過建議劑量。
  - (四) 不要服用本藥超過七日。
  - (五) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - (六) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
  - (七) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - (八) 不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

年 齡	劑 量
成人及 15 歲以上	一天三次，一次一粒，飯後服用

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身 體 部 位	副 作 用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情形產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 6-1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】 請置於緊密容器內，並於25°C以下避光儲存。

衛署藥製字第 G-10647 050211號

長安化學工業股份有限公司  
 彰化縣福興鄉萬豐村福工路19號、19-1號