

花香版

P 485C

12.5x19.5

2017.06.

"中美" 利甲康® 抗甲癬油劑 花香 Alikang Nail Lacquer "C.M."

衛署藥製字第055106號 G.M.P. G -11032

【藥物介紹】

- (1) 藥品為一種局部抗黴菌劑，主要成分 Amorolfine HCL 屬於新類別的抗黴菌藥品，主要的作用是改變黴菌細胞膜而達到抑制黴菌及殺黴菌的作用。
(2) 本藥所含的成分可穿透趾(指)甲片，因此能夠根絕在趾(指)甲床內難以接觸到的黴菌。
(3) 本藥的給藥方式，全身性吸收率非常低。

【成 分】 Each ml contains :

有效成分及含量：Amorolfine Hydrochloride.....55.74mg
其他成分(賦形劑) : Propylene Glycol、Methacrylic Acid Copolymer、Ethyl Acetate、Diethylene Glycol Monoethyl Ether、Flower Perfume、Alcohol

【用途(適應症)】由皮真菌、酵母菌及黴菌引起之遠端及外側之輕度甲癬。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
(1) 曾經因本類藥物引起過敏症狀者。
二、有下列情形者，使用前請洽醫生診治：
(1) 深部皮膚組織感染。
(2) 目前本品尚無治療兒童之臨床經驗，因此不宜用於兒童。
(3) 未滿12歲。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(1) 孕婦、乳婦或可能懷孕婦女。
(2) 正在服用其他藥品的人(包含不是醫師處方的藥品)。
四、其他使用上注意事項：
(1) 用於患癬部位的指甲銼刀，不可再用於健康的趾(指)甲。
(2) 治療期間應避免使用化妝品類的指甲油劑及人工指甲。
(3) 使用前須由專科醫師確定診斷，連續使用3個月若無療效，應尋求專科醫師診治。
(4) 應持續使用本品至趾(指)甲再生，患部痊癒為止，請勿間斷；治療時間視感染的程度、部位及趾(指)甲生長速度而定，通常手指甲需六個月，腳趾甲需九至十二個月。
(5) 為防止兒童誤食請妥善保管。
(6) 避免陽光直射。

- (7) 勿超過建議使用量。
(8) 塗抹後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
(9) 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
(10) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
(11) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
(12) 工作上用到有機溶劑(稀釋液、礦物油)時，應穿戴防透手套保護趾(指)甲上本藥品的完整。

【用法用量】

成人及大於12歲之兒童	將此油劑塗於患部之手、腳趾，每週1~2次
12歲以下之兒童	請洽醫師診治

使用步驟：

1. 初次塗敷本藥品之前，應先小心清潔趾(指)甲，使用可棄式的指甲銼刀將趾(指)甲患部(尤其是指甲表面)，小心不要銼到趾(指)甲周圍的皮膚。
注意：用在感染趾(指)甲的銼刀禁用在健康趾(指)甲。
2. 以酒精棉片擦拭，清潔受感染的趾(指)甲表面。
3. 將藥劑滴在塗藥板上，塗藥板請勿在瓶口邊緣括擦。
備註：塗藥板可提供定量的油劑。
4. 使用塗藥板將本藥品塗滿患部整片趾(指)甲表面。
5. 此藥瓶在使用後需立刻關緊以免油劑揮發乾掉。
6. 對每片受感染的趾(指)甲患部重複步驟1、2、3、4。
7. 此油劑大約3~5分鐘可乾。
8. 用後以清潔趾(指)甲所用的酒精棉紙，清潔塗藥板，擦淨後，可重複使用。若瓶口沾有藥劑，請用酒精棉紙一併擦拭。

備註：每次使用本油劑時皆應循這些步驟。

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚系統	局部皮膚刺激、刺痛及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(1) 全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣等。
(2) 若有任何不適情況產生。
(3) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】4000毫升以下玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】

1. 儲存不超過25°C之溫度下，避免陽光直射之陰涼處，並避開熱源。
2. 每次使用完後，要立即蓋緊以免油劑揮發乾掉。

委託者：

興中美 生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F

製造廠：

C.M.
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諸狗專線：04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>