可可版

P 485C

12.5x19.5

2017.06.

"中美" **利甲康®** 抗甲癬油劑 可可

Alikang Nail Lacquer "C.M."

衛署藥製字第055106號　G.M.P. G-11032

【藥物介紹】

(1) 藥品為一種局部抗黴菌劑，主要成分 Amorolfine HCL 屬於新類別的抗黴菌藥品，主要的作用是改變黴菌細胞膜而達到抑制黴菌及殺黴菌的作用。
(2) 本藥所含的成分可穿透趾(指)甲片，因此能夠根絕在趾(指)甲床內難以接觸到的黴菌。
(3) 本藥的給藥方式，全身性吸收率非常低。

【成　分】Each ml contains：

有效成分及含量：Amorolfine Hydrochloride.....55.74mg

其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Methacrylic Acid Copolymer、Ethyl Acetate、Diethylene Glycol Monoethyl Ether、Chocolate Essence、Alcohol

【用途(適應症)】由皮真菌、酵母菌及黴菌引起之遠端及外側之輕度甲癬。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
　(1) 曾經因本類藥物引起過敏症狀者。
二、有下列情形者，使用前請洽醫生診治：
　(1) 深部皮膚組織感染。
　(2) 目前本品尚無治療兒童之臨床經驗，因此不宜用於兒童。
　(3) 未滿12歲
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
　(1) 孕婦、乳婦或可能懷孕婦女。
　(2) 正在服用其他藥品的人（包含不是醫師處方的藥品）。
四、其他使用上注意事項：
　(1) 用於患癬部位的指甲銼刀，不可再用於健康的趾(指)甲。
　(2) 治療期間應避免使用化妝品類的指甲油劑及人工指甲。
　(3) 使用前須由專科醫師確定診斷，連續使用3個月若無療效，應尋求專科醫師診治。
　(4) 應持續使用本品至趾(指)甲再生，患部痊癒為止，請勿間斷；治療時間視感染的程度、部位及趾(指)甲生長速度而定，通常手指甲需六個月，腳趾甲需九至十二個月。
　(5) 為防止兒童誤食請妥善保管。
　(6) 避免陽光直射。
　(7) 勿超過建議使用量。
　(8) 塗抹後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
　(9) 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
　(10) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
　(11) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
　(12) 工作上用到有機溶劑(稀釋液、礦物油)時，應穿戴防透手套保護趾(指)甲上本藥品的完整。

【用法用量】

成人及大於12歲之兒童	將此油劑塗於患部之手、腳趾，每週1－2次
12歲以下之兒童	請洽醫師診治

使用步驟：

1.初次塗敷本藥品之前，應先小心清潔趾(指)甲，使用可棄式的指甲銼刀將趾(指)甲患部(尤其是指甲表面)，小心不要銼到趾(指)甲周圍的皮膚。
注意：用在感染趾(指)甲的銼刀禁用在健康趾(指)甲。
2.以酒精棉片擦拭，清潔受感染的指(趾)甲表面。
3.將藥劑滴在塗藥板上，塗藥板請勿在瓶口邊緣括擦。
備註：塗藥板可提供定量的油劑。
4.使用塗藥板將本藥品塗滿患部整片趾(指)甲表面。
5.此藥瓶在使用後需立刻關緊以免油劑揮發乾掉。
6.對每片受感染的趾(指)甲患部重複步驟1、2、3、4。
7.此油劑大約3~5分鐘可乾。
8.用後以清潔趾(指)甲所用的酒精棉紙，清潔塗藥板，擦淨後，可重複使用。若瓶口沾有藥劑，請用酒精棉紙一併擦拭。
備註：每次使用本油劑時皆應循這些步驟。

【警　語】

● 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚系統	局部皮膚刺激、刺痛及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

● 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(1)全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣等。
(2)若有任何不適情況產生。
(3)自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】4000毫升以下玻璃瓶裝。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】
1.儲存不超過25℃之溫度下，避免陽光直射之陰涼處，並避開熱源。
2.每次使用完後，要立即蓋緊以免油劑揮發乾掉。

委託者：
興中美 生技有限公司 Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F

製造廠：
PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號　諮詢專線：04-7524166
http://www.chungmei.com.tw