


註

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

2016-12-30



賜你免痛 加強膜衣錠 Sulimeton Extra F.C. Caplets

【NCC/GMP優良藥品】

【成分】

有效成分及含量：

Acetaminophen (乙醯胺酚).....500mg

Caffeine Anhydrous.....65mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Starch Glycolate, Povidone, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate, Talc, Hypromellose, Ethyl Alcohol

【作用】

賜你免痛加強膜衣錠為一有效之鎮痛、解熱劑。

本品含咖啡因，咖啡因經常與Acetaminophen合併使用，可溫和地刺激中樞神經。

【用途(適應症)】

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】請詳閱說明書後依指示使用

一、有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 12歲以下。

2. 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3. 有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

2. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其它使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量。

4. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

5. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

6. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年 齡	用法用量
成人及12歲以上	發燒或需要時服(使)用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服(使)用。每24小時內不可超過4次。每次1錠。

【警語】

一、服用本藥品後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴

二、服用本藥品後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。

2. 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

3. 服用過量〔每日超過4,000毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

4. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【包裝】2~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存】30°C以下儲存。

衛署藥製字第 055265 號



三洋藥品

藥 商：三洋藥品工業股份有限公司
高雄市苓雅區中正二路175號23樓

製 造 廠：三洋藥品工業股份有限公司大發廠