10.5cm

衛署藥製字第055414號
GMP G-11128

〝黃氏〞

疏便腸溶膜衣錠

EXLAX E.C. Tablets "H.S."

【成分】
有效成分及含量：Each E.C. Tablet Contains：
Bisacodyl.....5mg
Docusate Sodium.....16.75mg
其他成分(賦形劑)：Lactose、Starch Corn、Povidone、Magnesium Stearate、Alcohol 95%、Hydroxypropylmethylcellulose phthalate、Polyethylene glycol 6000、Span 80、Propylene glycol、Aerosil 200、Talc、Tartrazine aluminum lake、Sunset yellow FCF aluminum lake、Titanium dioxide、Isopropyl alcohol。

【用途(適應症)】緩解便祕。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍、狹窄或粘黏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
(一)十二歲以下。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)連續使用一星期以上。
(三)併用其他瀉劑。
四、其他使用上注意事項
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便祕。
(五)本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
(六)長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。
(七)須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且用藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。
(八)本藥不可與礦物油合用。
(九)刺激型瀉劑無法抑制卡路里吸收，因此不能幫助減重。此類藥品會導致水瀉、腹痛與脫水，並因脫水造成短期體重下降。嚴重脫水可能會造成顫抖、無力、視覺模糊、暈厥、腎損傷，甚至死亡，往往需要藥物治療。
(十)過度使用刺激型瀉劑可能會導致電解質不平衡。體內鈉、鉀、鎂、磷為維持神經肌肉所需之特定電解質，破壞此平衡可能會造成大腸及心臟功能異常。為避免上述風險，需避免過度或不正確的使用瀉劑。

【用法用量】本藥應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。初次應使用最小劑量，在視通便情況增減用量。

成人及12歲以上	一日一次，一次1~3錠，於睡前(或空腹時)服用。
12歲以下	使用前請洽醫師診治。

【警語】
一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
皮膚	發疹等過敏症狀。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
(一)有任何不適情況產生。
(二)腹瀉持續不止或更嚴重。
(三)有血便及自發性腸道出血狀況。
(四)使用一星期後無效。

【包裝】2~1000錠鋁箔盒裝。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲存】氣密容器，25℃保存。

PIC/S GMP藥廠
黃氏製藥股份有限公司
HWANG'S Pharmaceutical Co., Ltd.
SINCE 1961 雲林縣斗南鎮大同路444巷11號

T-77

18.5cm