汰疣凝乳膏

Wart Del Cream

【說明】汰疣凝乳膏是一種內含有效成分0.15%w/w Podophyllotoxin (1.5mg/g)的白色均質乳膏。

【賦形劑】Kalcol 8685 (Cetyl Stearyl Alcohol), Mineral oil, Propyl Paraben, Isopropyl Myristate, Arlacel 165, Butylated Hydroxytoluene,Polyoxyethylene (40) Stearate, Glyceryl Monostearate Self Emulsifying, Sorbic Acid, Stearic Acid, Methyl Paraben, Purified Water

【藥理特性】(依文獻記載)

Podophyllotoxin是由植物中純化萃取出的抗病毒物質，能有效抑制細胞中期的有絲分裂過程。此種療效被認爲是因Podophyllotoxin具有抑制細胞生長及能侵入被病毒感染的細胞所致。

【適應症】

生殖器疣（包括外生殖器及肛門附近的疣)。

【用法用量】

使用汰疣凝乳膏前，先用肥皂及清水洗淨患處並拭乾，再用指尖塗抹恰好足以覆蓋長疣處之劑量並按摩。每次塗藥後請洗淨雙手。

勿將本品塗於正常皮膚上，若不慎觸及，請用肥皂及清水洗去。每日兩次，早晚各一次，連續使用三天後，停藥四天(此爲一個治療週期)。於第一個治療週期結束後，若是有疣仍未治癒，請重複上述治療週期（每日兩次，連續三天後，停藥四天)。汰疣凝乳膏最多可使用四個治療週期，若是有疣仍未治癒，請回診洽詢您的醫師。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X



若疣大於4平方公分，建議由醫護人員監督下使用。

女性患者請利用鏡子，將其置於適當位置(如右圖)，方便藥物塗抹於患處。

本藥須由醫師處方使用

【禁忌】（依文獻記載）

開放性傷口 (例如：手術後傷口）、孩童、對Podophyllotoxin成份過敏者、或是近三個月內已使用過Podophyllotoxin其他製劑者。

【懷孕及授乳期婦女使用】懷孕及授乳期婦女不建議使用。

【副作用】（依文獻記載）

開始治療的第2或第3天，當疣消失時會發生刺激感、癢感、敏感性及刺痛症狀。不過大部分屬輕微症狀且很快就會恢復。

【藥物交互作用】（依文獻記載）

目前並無相關報告。

【注意事項】（依文獻記載）

避免觸及眼睛，若不慎觸及請立即用清水沖洗。 汰疣凝乳膏對正常皮膚具有傷害性，應避免長期將藥物停留於正常皮膚上。治療期間避免性交 (以免交叉感染)， 若仍無法避免，應使用保險套。

【包裝】1000公克(含)以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝

【儲存】請於有效期限內使用，使用後請拴緊蓋口，並存放於25℃以下。

衛署藥製字第 GMP G-11156 055546 號。

【製 造 廠】

中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠　　址：251新北市淡水區埤島里行忠路120號
服務專線：(02)8631-0018

SCD-151
04