普拿疼 舒痛散

Panadol Analgesic Powder
鎮痛解熱劑 有效緩解疼痛及發燒

【成分】
每公克　　含有 Acetaminophen 462.96 毫克，及 Caffeine 54.17 毫克
每包(1.2 公克)　含有 Acetaminophen　500 毫克，及 Caffeine　65 毫克

【作用】
普拿疼舒痛散經臨床證實為一有效之陣痛、解熱劑。其鎮痛、解熱效果與阿司匹靈相等，但不似阿斯匹靈或含阿司匹靈之藥品會導致許多副作用。其膠囊型錠之劑型能使病人易於吞服。
普拿疼舒痛散含咖啡因，口服後，可溫和地刺激中樞神經，使人保持清醒且對疲勞的患者有提神的功效。咖啡因經常與 Acetaminophen 合併使用。

【適應症】
退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【注意事項】
- **防止兒童誤食，請妥善保管。**
- **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
- **除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。**
- **勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。**
- **不得併服含酒精飲料。**

【警語】
- **服用後，所有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。**
- **除非醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況使用：**
  1. **三歲以下不建議自行使用。**
  2. **曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。**
- **服用本製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。**
- **成人不得連續服用本類製劑超過七天，小孩不得超過三天，適情況需要，服用本類製劑前，請洽醫師。**
- **本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如:茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引**

起心搏過速。

- 肝毒性：
  (一) 使用 acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。
  (二) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。病人應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險。
- 過量：
  (一) 服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
  (二) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
  (三) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。
- 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。
- 嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis,AGEP）、史蒂文生氏-強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome,SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis,TEN）。出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【用法用量】

- 發燒或需要時使用，若症狀持續，則每 4~6 小時可重複服用，每 24 小時內不可超過 4 次。成人每次 1 包(1.2 公克)，12 歲以上適用成人劑量。
- 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】

- 2-833 包鋁箔袋盒裝(每包 1.2 公克)
- 30°C 以下，密封貯存
- 衛署藥製字第 055943 號

委託者: 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司
地址: 台北市忠孝西路一段 66 號 24 樓
製造廠: 聯亞藥業股份有限公司新竹廠
地址: 新竹縣湖口鄉光復北路 45 號