Sen Sheng® 人生製藥 PIC/S GMP

渡辺ワタナベ Watanabe
日商 渡辺薬品工業株式会社 商標授權



渡邊童童眼藥水

Watanabe Tonton Eye Drops

“渡邊童童眼藥水”含有對眼睛疲勞具有緩解作用之Potassium and Magnesium L-Aspartate和Taurine，緩解過敏症之抗組織胺劑*dl*-Chlorpheniramine maleate，以及對眼結膜之過敏性炎症具有緩解作用之Dipotassium Glycyrrhizinate，可有效緩解眼睛疲勞、眼睛癢及眼睛不適。

【成分】

有效成分及含量：

每**mL**中含有

Potassium and Magnesium L-Aspartate(equal mixture)..... 4.0 mg
Taurine.....10.0 mg
Neostigmine Methylsulfate.....0.01 mg
***dl*-Chlorpheniramine Maleate.....0.2 mg**
Dipotassium Glycyrrhizinate.....1.0 mg

其他成分(賦形劑)：

Benzalkonium Chloride、Potassium Chloride、Sodium Chloride、Sodium Phosphate Dibasic、Purified Water。

【用途(適應症)】：暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適，眼睛癢，眼睛疲勞。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
　(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
　(一)正在接受醫師治療或醫生處方眼藥的人。
三、其他使用上注意事項
　(一)爲防止兒童誤食請妥善保管。
　(二)避免陽光直射。
　(三)使用前，請洗淨雙手。
　(四)請依照藥品標示使用。
　(五)以下情形，請勿繼續使用。
　　1、超過保存期限的眼藥水。
　　2、開瓶28天後。
　　3、藥液混濁、變色或出現異物時。
　(六)爲避免汙染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
　(七)如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
　　1.使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
　　2.使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
　(八)配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

【用法用量】：一天3至4次，每次1至2滴。

【警語】：
服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)連續使用三天症狀沒有改善。
(二)使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
(三)若有任何不適情況產生。

【包裝】：100毫升以下塑膠瓶裝。
【儲存溫度】：25℃以下
【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。
衛署藥製字第055971號
委託者：人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
製造廠：台灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區爲隨里爲隨東路50號

PIC/S GMP

PIC/S GMP優良藥廠
人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN



有效成分及含量Each ml Contains：
Potassium and Magnesium L-Aspartate(equal mixture)..4 mg
Taurine.....10.0mg
Neostigmine Methylsulfate.....0.01mg
dl-Chlorpheniramine Maleate.....0.2mg
Dipotassium Glycyrrhizinate.....1.0mg
用途(適應症)：暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適，眼睛癢，眼睛疲勞。
用法用量及注意事項：請詳閱說明書後使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。
委託者：人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
製造廠：台灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨里為隨東路50號　製造批號：
衛署藥製字第055971號　保存期限：