助消化解脹劑

腹釋寧消化 腸溶糖衣錠
Phazin-P Enteric S.C. Tablets

腹釋寧消化的藥錠外層為胃溶層，含有Simethicone，能消除胃部脹氣；內層為腸溶層，含有Pancreatin和Simethicone，能在十二指腸和小腸pH高於5.5的腸液中崩散。其中Pancreatin所含之Protease(蛋白酶)、Amylase(澱粉酶)、Lipase(脂肪酶)等，能消除腸內脹氣和幫助消化，對於消化不良、胃腸脹氣等均能緩解。

【成分】每錠中含有：

有效成分及含量	含量	主要作用
Simethicone	**30 mg**	特殊的活性消脹氣成分，以物理界面活性特質，降低氣泡的表面張力，使胃、腸脹氣容易釋出，而達到卓越的消脹氣效果。
Pancreatin	**125 mg**	消化酵素。
(eq. to Starch Saccharifying Activity	**625 JP Units**	澱粉酶的澱粉糖化活性，能將澱粉轉化為麥芽糖。
Proteolytic Activity	**12,500 JP Units**	蛋白酶的蛋白水解活性，能使食物中較大分子的蛋白質分解成較小分子的胜肽。
Lipolytic Activity)	**438 JP Units**	脂肪酶的脂肪分解活性，能將脂肪裂解成脂肪酸和甘油。
其他成分(賦形劑)	Lactose Monohydrate, Polyoxyl 40 Stearate, Sodium Starch Glycolate, Povidone K-30, Corn Starch, Pregelatinized Starch, Hydroxypropyl Methylcellulose Phthalate, Talc, Sucrose Granule, Gelatin, Calcium Phosphate Dibasic, Tween 80, Titanium Dioxide, Erythrosine, Indigocarmine, Sunset Yellow FCF, Carnauba Wax	

【用途 (適應症)】

幫助消化，解除脹氣，緩解氣脹相關症狀。

【使用上注意事項】

- **有下列情形者，請勿使用**
  (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- **有下列情形者，使用前請洽醫師診治**
  (1) 6歲以下。
- **有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生**
  (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

- **其他使用上注意事項**

  (1)為防止兒童誤食請妥善保管。

  (2)避免陽光直射。

  (3)勿超過建議使用量。

  (4)藥品應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

【用法用量】

年齡	用量	用法
成人及12歲以上	每次2錠。	一天3至4次，或需要時服用。
6歲以上未滿12歲	每次1錠。	
6歲以下	請洽醫師診治。	

【警語】

- **服用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:**

身體部位	副作用
其他	偶有過敏

- **服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：**

  (1)若有任何不適情況產生。

  (2)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

  (3)若發生以下症狀：

身體部位	副作用
腸胃道	腹痛、胃痛、下痢、便祕
其他過敏反應	皮膚過敏、癢疹

【包裝】12~1000錠塑膠瓶裝；PTP鋁箔盒裝。

【貯存條件】請置於25℃以下。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 G-11340 056651 號

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷4 號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號