“信東”碘化鉀 錠 130 毫克

Potassium Iodide Tablets 130mg “TBC”

【碘片之介紹】
碘是一種微量元素，主要存在於海帶、海苔中，而碘片則是碘化鉀之通稱，含有穩定碘。本碘片劑量為 130 毫克，穩定碘含量是 100 毫克。

【碘片效用】
1. 碘片可阻止游離碘集入甲狀腺，只要有足夠的量就可以阻止放射性碘進入甲狀腺，服用三十分鐘後，就可以發生阻塞功能。放射性碘由曝露環境吸入到甲狀腺約需十到十二小時，故在吸入後三到四小時服用本藥劑，可以阻擋百分之五十以上之放射碘進入甲狀腺內。
2. 服用碘片後，穩定碘即先蓄積於甲狀腺中，食物中適量的碘可維護甲狀腺之正常功能。唯於核子事故發生時，如有大量放射性碘經由呼吸道進入體內，將會傷害甲狀腺，影響甲狀腺功能，日後亦可能有罹患甲狀腺癌之虞。服用碘片後，放射性碘不易進入甲狀腺內，可避免或減少上述情形之發生。
3. 碘片對於核子事故發生時所釋放之其他放射性物質並無保護作用。

【碘片之使用時機】
核子事故發生或有發生之虞時，**由主管機關建議服用。**

【成分】
有效成分及含量：每錠含：
Potassium Iodide……130mg
其他成分(賦形劑)：Mannitol、Hydroxypropyl Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【用途(適應症)】
限於輻射緊急事故，保護甲狀腺時使用。

【使用上注意事項】
- 有下列情形者，請勿使用：
  碘過敏者不可服用碘片。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  (1) 有甲狀腺疾病的人。
  (2) 孕婦、可能懷孕婦女。
  (3) 新生兒。
  (4) 40 歲以上成人。
- 其他使用上注意事項：
  (1) 應存放於兒童觸摸不到的地點。
  (2) 兒童服用方法之建議：可磨成粉末，拌合橘子汁、糖汁、果醬服用。
  (3) 當主管機關告知要使用碘片才可使用。
  (4) 當需要使用時，每 24 小時服用 1 次，請勿超過，因可能會增加副作用機會。

【用法用量】

大於 40 歲之成人	不建議使用，除非暴露量>5Gy 時，每日一錠。
18~40 歲成人	每日一錠。
12~18 歲青少年	體重 70 公斤以上者，每日一錠。70 公斤以下者，每日半錠。
3~12 歲兒童	每日半錠。
1 個月~3 歲嬰幼兒	每日四分之一錠。
小於 1 個月新生兒	每日八分之一錠。
應於飯後三十分鐘內服用，每次服用盡可能間隔二十四小時。	

【警語】
- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  (1) 少數人服用碘片後，可能出現皮膚疹、唾液腺腫大、金屬性味覺、嘴巴或喉嚨有燒灼感、牙齒和牙齦酸痛、感冒樣之症狀、胃不舒服和腹瀉。少部份人有較嚴重的過敏症狀，包括發燒和關節痛、臉和身體部腫脹，甚至呼吸困難，應立即停止服藥並就醫。
  (2) 有可能出現流涎(唾液分泌較多，導致流口水：salivation)、唾液腺腫大(swelling of salivary gland)、甲狀腺機能亢進或低下、甲狀腺腫、頭疼(headache)等，這些在停藥後將逐漸消失，如程度嚴重應由醫師處理。

【包裝】
2～1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【保存條件】
本藥應儲存於 25℃以下、緊密容器，貯於乾燥避光且孩童不易取得處所。

【類別】
醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 056668 號
諮詢專線：0800-231525

信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號

54161090