膚喜定 乳膏

Fusidine Cream

【主 成 分】每公克中含
Fusidic acid ----------20mg

【賦 形 劑】Kaochol 8685 (Cetyl Stearyl Alcohol), Mineral Oil Light, Propyl Paraben, Propylene Glycol , Cetomacrogol 1000, Vitamin E Acetate , Glyceryl Monostearate Self-Emulsifying, White Petrolatum , Methyl Paraben, Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate, Water Purified

【特 性】(依文獻記載)
Fucidin是一種具有強效抗菌作用的抗生素，對大部分的革蘭氏陽性菌有效，尤其是葡萄球菌，亦包括對盤尼西林或其他抗生素有抗藥性者，於臨床試驗和經驗證實，除了對各種皮膚感染症有卓效外，甚至應用於完整無傷口的皮膚，Fucidin亦具有滲透入感染病灶的獨特能力。

【適 應 症】
葡萄球菌、鏈球菌或其他對Fucidin敏感的細菌的皮膚感染症。

【效 能】(依文獻記載)
皮膚的細菌感染症、癬、膿皰、毛囊炎、汗腺炎、癰、甲溝炎、鬚癬、紅癬 。

【用法．用量】
乳膏適量塗於患部，每日2-3次，一般持續塗七天，亦可依病情延長用藥的時間。

【副 作 用】(依文獻記載)
耐受性良好，過敏反應極罕見。

【貯 存 條 件】
請放置於25℃以下乾燥場所

【包 裝 種 類】
100公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝，450公克、1000公克塑膠瓶裝。

【類 別】 本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 GMP G-11392 056711 號。

【製 造 廠】
中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠 址：251 新北市淡水區行忠路120號
服務專線：(02)8631-0018

SCD-168
03