



曼秀雷敦®舒效消炎藥膠布

油性基劑

MENTHOLATUM® KETOPROFEN PLASTER



•緩解運動、工作、疲勞引起之關節
肌肉疼痛

特點

- 1 曼秀雷敦舒效消炎藥膠布(油性基劑)含Ketoprofen(消炎鎮痛成份)，可抑制前列腺素(Prostaglandins)的生合成，而前列腺素會引起疼痛、腫脹、發炎，所以曼秀雷敦舒效消炎藥膠布具有消炎、止痛等作用，能滲入肌肉和關節組織。能緩解關節炎、肩、腰、腿部肌肉酸痛及運動傷害之發炎紅腫疼痛。
- 2 曼秀雷敦舒效消炎藥膠布(油性基劑)能緩解肌肉及關節痛，含薄荷成份，敷貼後，會有清涼舒適的感覺。
- 3 曼秀雷敦舒效消炎藥膠布(油性基劑)使用伸縮自如的不織布，能緊密黏著於患部，不需另行使用膠帶固定。

本品適用於變形性關節症、肩關節周圍炎、腱、腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨關節炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀之暫時緩解局部疼痛。

主成份 每3.85g膏體 (140cm²) 中含有：
Ketoprofen 30mg

賦形劑 Adhesive Plaster, Zinc Oxide, Purified Lanolin, Silicon Dioxide, L-Menthol, Menthol Oil, Paraffin Oil, Titanium Dioxide, Alcohol, Aluminum Chlorhydrat

適應症 暫時緩解局部疼痛

用法用量

- 1.依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日二次貼於患部，慢性疾患，可一日換貼2~3次，切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部使用。
- 2.流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。

醫師藥師藥劑生指示藥品

副作用：偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎。



注意事項

- 1.請勿使用於濕疹、癢疹、傷口等部位。
- 2.對藥物化粧品等有過敏症狀者（例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹），使用前需請教醫師或藥師。
- 3.使用後將開封線條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。
- 4.須置於小孩接觸不到之處。
- 5.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 6.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 7.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 9.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 10.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 11.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 12.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 13.深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 14.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，非類固醇類抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。
- 15.兩歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

警語

- 1.對藥物各成份過敏者不得使用。
- 2.癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用非類固醇類抗炎劑會使病情惡化。
- 3.皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用非類固醇類抗發炎劑會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

包裝：2.64g膏體(8cm×12cm)/片，(1-20)片鋁箔袋裝

儲存：30°C以下儲存

衛署藥製字第057146號 GMP G-11518

製造批號/保存期限：詳見產品包裝底部標示

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠
地址：臺南市永康區環工路42-1號
消費者服務熱線：0800-231149

委託者：台灣曼秀雷敦股份有限公司
地址：台北市內湖區基湖路10巷57號6樓