G-11578 衛署藥製字第 057218 號

舒昶口服液

Freeflit Oral Saline Laxative

綱號：G33

口服鹽類緩瀉劑（本藥須由醫師處方使用）

適應症：緩解偶發性便秘，手術前、X 光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

主要成分：

主要成分(每 ml 含)		用途
Monobasic Sodium Phosphate	480 mg	鹽類緩瀉劑/腸灌洗
Dibasic Sodium Phosphate	180 mg	鹽類緩瀉劑/腸灌洗

*每茶匙(5 ml)含鈉 556 mg，相當於每 ml 含鈉 111.2 mg。

作用理論：鹽類緩瀉劑能增加水分滯留於小腸，因而促進排便功能。

緩瀉劑：

- 當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：
- 除非醫師建議，請勿使用過量(見警語)。每次服用不可超過 45 ml 且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水分。
- 服用量及方式：

年齡(歲)	步驟 1	步驟 2	24 小時最大劑量
成人、12 歲以上	15 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	45 ml
10 & 11 歲	15 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	15 ml
5 ~ 9 歲	7.5 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	7.5 ml
5 歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

*24 小時內服用量勿超過上表所示劑量

醫療程序前清腸

- 依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水分---最少 240 ml。
- **服用劑量：**每次清腸使用二次 30 ml 或 45 ml 舒昶口服液，兩次劑量服用間隔為 10 ~ 12 小時
- **每次服用方式：**

年齡(歲)	步驟 1	步驟 2
成人、12 歲以上	30 ~ 45 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝 3 杯約 720 ml 冷飲或水
10 & 11 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 ~ 9 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 歲以下	不可使用	不可使用

警語

- **24 小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。**
- **請勿使用於鬱血性心臟衰竭、腎臟疾病或 5 歲以下小孩。**
- **懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。**
- **若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。**
- **若您有腹痛、噁心、嘔吐、排便習慣改變持續 2 個禮拜、已經服用其他瀉劑治療便秘超過 1 禮拜，請先詢問過醫師後再使用。**
- **若您直腸出血、服藥後 6 小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆(此時請大量補充水分)。**
- **請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻求助醫護協助。**

其他資訊

- **一茶匙(5 ml)含：鈉 556 mg，本產品不含任何糖分。**
- **一般在服用後 30 分鐘至 6 小時會產生排便(視服用劑量不同而不同)。**
- **放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。**

儲存條件：30℃以下儲存。

包裝：100 毫升以下塑膠瓶裝。

賦形劑：

Saccharin sodium
Sodium benzoate
Glycerin
Flavor grapefruit
Purified water

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 Ⓑ