"永勝" "為您好" 服胃膜衣錠20毫克

Fuwell F.C.Tablets 20mg
"Good for you"

本品為Histamine H_2接受體拮抗劑，為Famotidine之製劑，本劑因拮抗胃粘膜壁細胞之Histamine H_2接受體而顯示胃酸分泌抑制作用。本劑之安全域(LD_{50}/ED_{50})廣，沒有抗男性荷爾蒙作用及藥物代謝酵素之阻害作用。臨床上，一日40mg，分1次或2次投予，針對胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合術後潰瘍、上部消化管出血、逆流性食道炎以及Zollinger-Ellison症候群。

【成分】：

每錠中含有Famotidine……20mg

【適應症】：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性stress潰瘍、出血性胃炎而引起的)、逆流性食道炎以及Zollinger-Ellison症候群。

【用法、用量】：

通常成人Famotidine，一日40mg，分一次或二次投予(早餐後、晚餐後或睡覺前)經口投予。依年齡、症狀適宜增減之。但上部消化管出血時，通常以注射劑開始治療，待能口服後，始改成經口投予。

本藥需由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 治療時，應充分觀察其經過，依病狀限用於治療上最小劑量；若本劑未見效果時，請改用其他療法。
2. 下列患者，請慎重投予：
   (1) 有藥物過敏症之既往歷的患者。
   (2) 有腎障礙之患者(因為血中濃度持續，所以需減少投予量或將投予間隔延長)。
   (3) 有肝障礙之患者(恐怕會使症狀惡化)。
   (4) 高齡者(本劑主要由腎臟排泄，高齡者因腎功能降低，所以會有血中濃度持續居高現象，應適度減量或將投藥間隔延長，並慎重投予)。
3. 本劑之投予會隱蔽胃癌引起的症狀；因此應在確認非惡性後始投予。
4. 交互作用：Azole系抗真菌藥(Etraconazole)〔有Azole系抗真菌藥，是以轉換為鹽酸鹽吸收的，所以與具有酸分泌抑制作用的本劑併用時，吸收性會降低，引起血中濃度降低的報告〕。

【副作用】：(罕有：0.1%以下，偶有：0.1～5%)

1. 重大副作用：
   (1) 休克：罕有，但需充份觀察，有異常情況時，請中止投藥，並採行適當之處置。
   (2) 汎血球減少，無顆粒球症：罕有，認有異常狀況時，請中止投予。
   (3) 罕有其他H_2接受體拮抗劑會出現的Anaphylaxis；間質性腎炎；再生不良性貧血；收縮不全等報告。若有以上症狀出現時，需立刻中止投予並採行適當處置。
2. 其他副作用
   (1) 過敏症：罕有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑)。當有這些症狀時，請中止投予。
   (2) 血液：罕有血小板減少、嗜酸球增多、偶有白血球減少，認為有異常時請中止投予。
   (3) 消化器：偶有便秘，罕有下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐、腹部膨滿感、食慾不振、口內炎等。
   (4) 循環器：罕有脈搏數減少、頻脈、房室阻滯、血壓上升、顏面潮紅、耳鳴等。
   (5) 肝臟：偶有SGOT、SGPT之上升等肝機能異常、罕有總Bilirubin、LDH之上升等。
   (6) 精神神經系：罕有全身倦怠、無力感、可逆性錯亂狀態、痙攣、頭痛、頭重感、失眠等。
   (7) 內分泌系：罕有月經不順、女性化乳房等、若有此情形時，請中止投予。
   (8) 其他：罕有顏面浮腫。

【警語】

1. 關於懷孕中投予之安全性尚未確立，孕婦或有可能懷孕的婦人，最好不要投予。而且，由於其會移行到母乳中；因此投予授乳婦時，應注意不要授乳。
2. 對於小兒使用之安全性未確立。

【藥效、藥動】：

1. 有胃酸及胃蛋白酶(Pepsin)分泌之抑制作用。
2. 0.1～0.2mg/kg之靜脈內投予，有增加健康正常人之胃粘膜血流量之傾向。
3. 經口投予時，投予後1～3小時達到高血中濃度。血中之半衰期約3小時。

【賦形劑】：L.S.G.(Lactose Starch PVP K-30)、Microcrystalline Cellulose 301、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 6cps、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 15cps、Talc、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 6000。

【貯存】：在室溫25℃以下避光保存。

【包裝】：4～1000塑膠瓶或鋁箔盒裝。

衛署藥製字第057271號

委託者 為您好醫藥生技股份有限公司
台北市松山區八德路三段219號12樓
諮詢電話：0800-895168

製造廠 永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號