

肝膽疾病
很常見：肝轉胺酶(ALT、AST)濃度上升(見警語和注意事項)
研究報告
很常見：總膽紅素減少、GGT 上升，血漿泌乳素濃度上升¹⁶

前邊緣範圍(≥1.016 至 <1.467 mmol/l)及空腹三酰甘油脂從治療油脂(≥1.467 mmol/l)增加到高三酰甘油脂總膽固醇從治療前空腹正常值(<4.39 mmol/l)增加到高總膽固醇(≥5.17 mmol/l)是常見的。從治療前邊緣範圍(≥4.39 至 <5.17 mmol/l)增加到高總膽固醇(≥5.17 mmol/l)是很常見的。
¹⁶ 有 47.4% 青少年病患之血漿泌乳素濃度升高。

過量 (依文獻記載)
徵兆和症狀：(依文獻記載)過量的常見症狀(>10%發生率)包括心跳過快、精神激動/攻擊性、發音困難、各種體外症狀，和意識降低(程度從鎮靜到昏迷)。其他醫學上過量的明顯後續現象包括妄想、痙攣、昏迷、疑似抗精神病藥物惡性症候群、呼吸抑制、肺部異物吸入、高血壓或低血壓、心律不整(<2%過量案例)和心肺停止。口服 Olanzapine，有 450 毫克急性藥物過量導致死亡的案例，但是也有口服約 2 公克急性藥物過量存活的案例。
過量的處理：(依文獻記載)目前對 olanzapine 尚無特殊的解毒劑。不建議催吐。處理藥物過量的標準程序可能適用(即洗胃、給予活性碳)。併用活性碳顯示減少口服 olanzapine 的生體可用率達 50% 到 60%。根據病患臨床表現，應給予症狀治療和監測影響生命的器官功能，包括低血壓和呼吸衰竭的治療及支持呼吸功能。不要使用 epinephrine、dopamine 或其他交感神經的乙型受體作用劑，因為乙型受體受刺激可能加劇低血壓。必須監視心血管功能以偵測可能產生的心律不整。

帶中性白血球減少症、血小板減少症或貧血。在有血球減少症的狗中，骨髓中的前驅細胞(progenitor)和增生細胞並沒有產生不良作用。
生育能力毒性：Olanzapine 沒有致畸胎的作用。鎮靜作用會影響公鼠的交配能力。劑量在 1.1 毫克/公斤時(人體最高劑量的 3 倍)，影響雌鼠的動情週期，且劑量在 3 毫克/公斤時(人體最高劑量的 9 倍)，致死變性：哺乳動物經體外及體內各種劑量範圍的標準測試，包括細菌突變試驗，得知 olanzapine 不會致突變或 clastogenic。
致癌性：根據小白鼠及大白鼠實驗結果，olanzapine 無致癌性。
不相容性：無。

儲存特殊注意事項：以原包裝儲存於 25°C 以下。

包裝：5 毫克:4~1000 鎂鋁箔盒裝。10 毫克:2~1000 鎂鋁箔盒裝。

賦形劑：Adsolider 101, Crospovidone, Aspartame, Mannitol (ODT), Magnesium stearate, Talc



請勿按壓泡殼
Do not press

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL : (02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 (B)

若寧® 口溶錠 10 毫克




28Tablets



請勿按壓泡殼
Do not press

成分：
Each Tablet contains : Olanzapine..... 10 mg
適應症：
思覺失調症及其他明顯有正性及/或負性之精神病，
雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號
http://www.ccpq.com.tw



4 47105961160922

Lot No. :
保存期限：
(西元年月日)

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號
http://www.ccpq.com.tw

Tabs.

若寧® 口溶錠 10 毫克

Olan® Orally Disintegrating Tablets 10 mg

成分：Each Tablet contains : Olanzapine 10 mg

適應症：思覺失調症及其他明顯有正性及/或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。

用法用量、注意事項：請詳閱說明書後使用。

本藥須由醫師處方使用。

以原包裝儲存於 25°C 以下。

衛署藥製字第 057321 號

Lot No. :

保存期限：

(西元年月日)

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號
http://www.ccpq.com.tw

105. 10. - 6

常見：口乾
肝膽疾病
很常見：肝轉胺酶(ALT、AST)濃度上升(見警語和注意事項)
研究報告
很常見：總膽紅素減少、GGT 上升，血漿泌乳素濃度上升¹⁵

由歐美到從治療前空腹正常值(<1.016 mmol/l)增加到高三酸甘油脂(≥1.467 mmol/l)及空腹三酸甘油脂從治療前邊緣範圍(≥1.016 至 <1.467 mmol/l)增加到高三酸甘油脂(≥1.467 mmol/l)。
¹⁵ 空腹總膽固醇從治療前空腹正常值(<4.39 mmol/l)增加到高總膽固醇(≥5.17 mmol/l)是常見的。從治療前邊緣範圍(≥4.39 至 <5.17 mmol/l)增加到高總膽固醇(≥5.17 mmol/l)是很常見的。

過量 (依文獻記載)
徵兆和症狀：(依文獻記載)過量的常見症狀(>10%發生率)包括心跳過快、精神激動/攻擊性、發音困難、各種難體外症狀，和意識降低(程度從鎮靜到昏迷)。其他醫學上過量的明顯後續現象包括妄想、痙攣、昏迷、疑似抗精神病藥物惡性症候群、呼吸抑制、肺部異物吸入、高血壓或低血壓、心律不整(<2%過量案例)和心肺停止。口服 Olanzapine，有 450 毫克急性藥物過量導致死亡的案例，但是也有口服約 2 公克急性藥物過量存活的案例。

過量的處理：(依文獻記載)目前對 olanzapine 尚無特殊的解毒劑。不建議催吐。處理藥物過量的標準程序可能適用(即洗胃、給予活性碳)。併用活性碳顯示減少口服 olanzapine 的生體可用率達 50%。根據病患臨床表現，應給予症狀治療和監測影響生命的器官功能，包括低血壓和呼吸作用劑，因為乙型受體受刺激可能加劇低血壓。必須監視心血管功能以偵測可能產生的心律不整。

7/2011/7/7 (主辦 olanzapine 嘴露置[AUC]大於人類給予 12 毫克劑量的 12~15 倍)治療的狗中，發現可逆性和增生細胞並沒有產生不良作用。


生育能力毒性：Olanzapine 沒有致畸胎的作用。鎮靜作用會影響公鼠的交配能力。劑量在 1.1 毫克/公斤時(人體最高劑量的 3 倍)，影響雌鼠的動情週期，且劑量在 3 毫克/公斤時(人體最高劑量的 9 倍)，致突變性：哺乳動物經體外及體內各種劑量範圍的標準測試，包括細菌突變試驗，得知 olanzapine 不會致突變或 clastogenic。
致癌性：根據小白鼠及大白鼠實驗結果，olanzapine 無致癌性。

不相容性：無

儲存特殊注意事項：以原包裝儲存於 25°C 以下。

包裝：5 毫克：4~1000 鎂鋁箔盒裝。10 毫克：2~1000 鎂鋁箔盒裝。

賦形劑：Adsolider 101, Crospovidone, Aspartame, Mannitol (ODT), Magnesium stearate, Talc




請勿按壓泡殼
Do not press

 中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市義陽路 23 號 TEL : (02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 (B)



Tabs.

若寧® 口溶錠 10 毫克
Olan® Orally Disintegrating Tablets 10 mg

藥物
管理署

105. 10. - 6

成分：Each Tablet contains : Olanzapine 10 mg

適應症：思覺失調症及其他明顯有正性及/或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。

用法用量、注意事項：請詳閱說明書後使用。

本藥須由醫師處方使用。

以原包裝儲存於 25°C 以下。

衛署藥製字第 057321 號

Lot No. :

保存期限：

(西元年月日)

 中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

<http://www.cccpg.com.tw>