



“杏輝”

cGMP 藥品

# 眸朗明 眼藥水

Cromomin Eye Drops "Sinphar"

成分：Each mL contains :

Cromolyn Sodium.....20mg

賦形劑：

Benzalkonium chloride 、Eddate disodium 、Water for injection

作用：

本點眼液劑係一抗眼睛過敏之局部用藥。

適應症：

過敏性結膜炎。

用法用量：

每天點四次。每次各點一滴於雙眼。本藥須由醫師處方使用。

使用須知：

1. 避免與他人共用。
2. 點藥時應避免碰觸瓶口並保持高度清潔衛生。
3. 每次使用後須將瓶蓋關緊。
4. 治療完成後，需丟棄剩餘之藥品。
5. 點藥時，頭向後傾，將下眼瞼向下拉，眼向上看，並點入藥水一滴於結膜囊內(眼睛及眼瞼之間的部位)，輕闔雙眼數秒鐘即可張開。
6. 建議在有效期限前用完，開封一個月後則丟棄不再使用。

注意事項：

1. 已知對本產品成分過敏者禁用。
2. 使用本品後，如症狀加劇，則需立即停藥就醫。
3. 勿超過建議劑量，使用本品時，如病情持續或惡化，或使用本品後而產生治療前沒有的症狀如眼睛刺激、麥粒腫或結膜腫脹的現象，則需求教於醫師。
4. 孕婦及授乳婦，需經由醫師評估及確認才能使用於懷孕及授乳期婦女。
5. 本品因含Benzalkonium chloride，因此於投藥20分鐘以內請勿戴軟式隱形眼鏡。
6. 尚無資料顯示交互作用。然而若欲與其他藥品併用時，應先徵求醫師或藥師意見。
7. 對開車或操作機械時的影響，尚無資料顯示。
8. 使用於孩童，需先諮詢於醫師。
9. 藥品請置於孩童無法取得之處。
10. 藥物過量及處理：以建議劑量局部使用本品，無毒性反應。誤食整瓶的量時仍未有毒性反應。若不慎大量投與或誤食，請就醫處理。

副作用：

可能引起眼睛刺痛或刺激感。上述現象通常在投藥初期幾天內即可消失，少數病人會有過敏反應、眼睛腫脹、眼緣乾燥或腫脹(或產生麥粒腫)。若有前述或其他未提及的副作用發生時，則徵詢醫師或藥師之意見。

儲存：30°C以下避光保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 057329 號  
G-11689 號

包裝：100毫升以下塑膠瓶裝。

cGMP



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website : <http://www.sinphar.com>