

"五洲"妥美亭膜衣錠

Tramacet F. C. Tablets



管4

衛署藥製字第057779號

主成分

每錠膜衣錠中含有：
Tramadol hydrochloride 37.5 mg
Acetaminophen 325 mg

賦形劑：

Lactose 200、Sodium Starch Glycolate、Povidone K30、Magnesium Stearate、Opadry II White、Iron Oxide Yellow

臨床資料

適應症

使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

用法用量

本藥須由醫師處方使用。
除非另有處方，本品應依下述給藥：

劑量-成人及16歲(含)以上兒童

本品最大單次劑量為每四至六小時服用一至兩錠，視需要減輕疼痛，一天最多服用八錠。

停止治療

戒除症狀可藉由逐漸減少藥物而緩解(參見警語及注意事項-停止治療)。

特殊族群

未滿16歲兒童

尚未確定兒童使用本品的安全性及有效性。

老年人(65歲(含)以上)

未發現65歲和65歲以上的病人使用本品之安全性和藥物動力學與較年輕者有差異。

腎功能不全

肌酐酸廓清率小於30 mL/min的病人，建議增加本品的給藥間隔，每12小時不要超過兩錠。

肝功能不全

本品不建議用於嚴重肝功能不全的病人。

用法

本品為口服使用。
本品可與食物併服或不與食物併服。

禁忌(依文獻記載)

本品禁用於：

- 之前曾對tramadol、acetaminophen、本品其它成分或鴉片過敏的病人。
- 發生酒精、助眠藥、麻醉藥、中樞作用止痛劑、鴉片或精神藥物急性中毒時。
- 同時或過去14天內使用單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)的病人。

警語及注意事項(依文獻記載)

應謹慎使用於未滿12歲兒童，當臨床效益大於風險時，方可考慮使用。

應謹慎使用於未滿18歲之扁桃腺及腺樣體切除術後止痛。

應謹慎使用於肥胖、具有阻塞型睡眠呼吸中止症、嚴重肺部疾病等情形之病人，因可能增加嚴重呼吸問題之風險。

用藥期間不建議哺乳，因可能對餵餵之嬰兒產生嚴重不良反應，包括：異常嗜睡、哺乳困難或嚴重呼吸問題。

血清素症候群(serotonin syndrome)

曾有併用 opioid類藥品與作用於血清素系統之藥品，發生危及生命之血清素症候群之通報案例，且在建議劑量範圍內使用亦可能發生。

作用於血清素系統之藥品包括：選擇性血清素回收抑制劑(SSRIs)、血清素與正腎上腺素回收抑制劑(SNRIs)、三環抗憂鬱劑(TCAs)、triptan類藥品、5-HT3受體拮抗劑、mirtazapine、trazodone、tramadol、單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)、linezolid及靜脈注射甲基藍(methylene blue)等。血清素症候群之症狀可能包括：精神狀態改變(如：躁動、幻覺、昏迷)、自律神經失調(如：心搏過速、血壓不穩、體溫過高)、神經肌肉系統異常(如：反射過度、協調困難、僵直)，可能伴隨胃腸道症狀(如：噁心、嘔吐、腹瀉)。症狀通常發生於藥品併用後幾小時至幾天內，但也可能延後發生。若懷疑病人發生血清素症候群，應停用本藥。

腎上腺功能不全(adrenal insufficiency)

曾有使用 opioid類藥品發生腎上腺功能不全之通報案例，多數案例發生於使用 opioid類藥品超過1個月後。腎上腺功能不全可能以非特異性的症狀表現，包括：噁心、嘔吐、厭食、疲倦、虛弱、眩暈及低血壓等。

若懷疑病人發生腎上腺功能不全，應儘速進行相關檢查，倘經確診，應停用原本的 opioid類藥品並持續使用皮質固醇治療直至腎上腺功能恢復。另可嘗試使用其他不同成分之 opioid類藥品，因有些案例於更換其他不同成分之 opioid類藥品後，未再出現腎上腺功能不全之情形。惟依現有資訊尚無法認定，是否有特定的 opioid類藥品發生腎上腺功能不全的風險較高。

併用benzodiazepine類藥品或其他中樞神經系統抑制劑

Opioid類藥品與benzodiazepine類藥品或其它中樞神經系統抑制劑(包括酒精)併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

肝毒性

本品含有tramadol HCl和acetaminophen。

使用acetaminophen(paracetamol)會有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。

過量服用acetaminophen可能是一種故意自殘行為，也可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。

有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應咐咐病人，病人亦應注意藥品的標示上是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

過敏/過敏性反應

在接受tramadol治療的病人中，曾有發生嚴重和極少數致死之過敏性反應的報告。這些事件通常都是發生於首次投藥之後。其他見於報告的過敏反應包括搔癢、尋麻疹、支氣管痙攣、血管性水腫、毒性表皮壞死溶解症、以及Stevens-Johnson症候群。曾對codeine及其他鴉片類藥物發生過敏反應的病人可能會有較高的風險，因此不可使用本品。

上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、尋麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

自殺風險

對有自殺傾向或成癮傾向的病人，切勿處方本品。

對正在使用鎮靜劑或抗憂鬱劑的病人，以及喝酒過量和患有情緒障礙或憂鬱症的病人，處方本品時應謹慎。審慎處方tramadol乃是安全使用本藥的基礎。對有憂鬱症或自殺傾向的病人，應考慮使用非麻醉性鎮痛劑。

在有情緒障礙或自殺念頭或意圖之過往病史的病人中，以及有濫用鎮靜劑、酒精及其他CNS活性

藥物之病史的病人中，曾有發生與使用tramadol相關之死亡的病例。

瘤

使用tramadol建議劑量的病人曾有癲癇發作的報告。自發性上市後報告指出癲癇發作的危險性會隨著tramadol劑量超過建議劑量而增加。服用選擇性serotonin再吸收抑制劑(SSRIs抗憂鬱劑或食慾抑制劑)、三環抗憂鬱劑(TCAs)及其它三環化合物(如cyclobenzaprine、promethazine等)或鴉片的病人，併服tramadol會增加癲癇發作的危險性。

服用MAO抑制劑、抗精神分裂症藥物(neuroleptics)或其它會降低癲癇發作閾值的藥物之病人，服用tramadol可能會增加癲癇發作的危險性。

癲癇病人、曾有癲癇發作史的病人或診斷確定有癲癇發作危險(如頭部外傷、代謝異常、戒除酒精及藥物、中樞神經系統[CNS]感染)的病人，發生癲癇發作的危險性也可能增加。Tramadol過量時，使用naloxone可能會增加癲癲發作的危險性。

類過敏性休克(anaphylactoid)反應

對codeine及其它鴉片類藥物曾有類過敏性休克反應的病人之危險性會增加，因此不能使用本品。

呼吸抑制

當有顯著呼吸抑制、或急性嚴重支氣管氣喘的病人以鴉片類藥物治療時，危及生命的呼吸抑制風險會增加。只有當此病人族群接受監測設置並且有急救設備可用的情形下，才能使用本品。

易發生呼吸抑制的病人使用本品要小心。併用大劑量tramadol與麻醉藥物或酒精可能會發生呼吸抑制。此類病例視同過量。若要給與naloxone，需小心使用因該藥可能會加劇癲癇發作。

Tramadol的CYP2D6超快速代謝(ultra-rapid metabolism)

本身為CYP2D6超快速代謝者(ultra-rapid metabolizer)的病人，在轉化tramadol成其活性代謝物(M1)上，可能比其他病人更快且完全。此快速轉化現象可能造成M1的血中濃度高於預期，而導致呼吸抑制的風險增加(請參見過量-症狀與徵兆，Tramadol)。建議已知為CYP2D6超快速代謝者的病人選擇替代藥物、降低劑量和／或增加tramadol過量癲癲(如呼吸抑制)的監視(請參見藥物特性和代謝)。

與中樞神經系統(CNS)抑制劑併用，包括酒精

合併使用tramadol(本品的一個活性成分)和CNS抑制劑，包括酒精，可能引起加成CNS抑制效果，包括深層鎮靜和呼吸抑制。使用於服用CNS抑制劑的病人時，應小心使用本品並且要降低劑量。(請參見交互作用)

顱內壓增加或頭部外傷

顱內壓增加或頭部外傷的病人使用本品要小心。

藥物依賴性與濫用的可能性

本品含有一活性成分tramadol。本品的止痛作用有一部分是歸因於活性成分tramadol與mu-鴉片接受體結合。即使在建議劑量下，當重複給予鴉片類藥物，可能產生耐受性、生理依賴性和心理依賴性。在處方本品之前評估每位病人對鴉片類藥物依賴和濫用的風險，並監測所有使用本品的病人發展這些行為的情形。有個人或家族物質濫用(包括藥物或酒精濫用或成癮)或精神疾病(例如：嚴重抑鬱)病史的病人，其風險會增加。

本品不能用於依賴鴉片類藥物的病人。已證明tramadol對某些先前曾依賴其它鴉片類藥物的病人，會再引起其生理依賴性。

酒精併用與肝毒性風險增加

不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

停止治療

突然停用本品可能會發生戒除症狀。突然停用tramadol hydrochloride亦極罕有發生恐慌、嚴重焦慮、幻覺、感覺異常、耳鳴及不尋常中樞神經系統症狀的報告。臨床經驗建議逐漸減少劑量可減輕戒除症狀。

與Serotonin再吸收抑制劑併用

本品用於正接受SSRIs(選擇性Serotonin再吸收抑制劑)的病人要非常小心。Tramadol與SSRI併用會增加不良反應的危險性，包括癲癇發作及serotonin症狀。

腎功能不全

腎功能不全病人使用本品之情形未有研究。肌酐酸廓清率小於30 mL/min的病人，建議增加本品的給藥間隔，每12小時不要超過兩錠。

肝功能不全

不建議本品用於嚴重肝功能不全病人。

嚴重皮膚反應

使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史帝文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

低血鈉症

服用本品的病人，曾有很罕見的低血鈉症的病例報告，通常在有誘發風險因子的病人(例如老年人和／或合併使用可能造成低血鈉症的藥物)才可能會造成低血鈉症。在某些案例報告，低血鈉症的出現是由於抗利尿激素分泌失調症候群(SIADH)，可經由停用本品和適當治療處置(如液體限制)解決。在本品治療過程中，建議監測有誘發風險因子的病人是否有低血鈉症症狀及癲癇。

一般注意事項

不要超過本品的建議劑量。

本品不要與其它含有tramadol或acetaminophen的藥品一起服用。

交互作用(依文獻記載)

併用MAO抑制劑

本品與MAO抑制劑不可合併使用、亦不可在其停藥的14天內使用，因為會增加癲癇及serotonin症狀的風險。(請參見禁忌)

併用Serotonin再吸收抑制劑

合併使用tramadol和SSRIs(選擇性Serotonin再吸收抑制劑)會增加不良反應風險，包括癲癇和serotonin症狀。服用SSRIs的病人需小心使用本品，並監測不良事件的徵兆。

中樞神經系統(CNS)抑制劑，包括酒精

合併使用tramadol和中樞神經系統抑制劑，例如benzodiazepines和其他鎮靜劑／安眠藥、麻醉劑、phenothiazines、安神劑、鴉片類藥物或酒精，可能產生加成CNS抑制效果，例如深層鎮靜和呼吸抑制。如果臨床上必須合併使用本品和CNS抑制劑，兩種藥物應處方最低有效劑量和最少併用時間，並密切追蹤病人的呼吸抑制徵兆。

併用Carbamazepine

Tramadol hydrochloride併用carbamazepine會顯著增加tramadol的代謝。正在服用carbamazepine的病人併用本品，可能會顯著降低本品主成分之一tramadol之止痛效果。

併用Quinidine

Tramadol會被CYP2D6代謝成M1(活性代謝物)。Quinidine與tramadol併用會增加tramadol的濃度。尚未明瞭這些現象的臨床結果。

併用Warfarin類化合物

本品若與warfarin類化合物併用，須在適當醫療情況下定期評估凝血時間，因為某些病人曾有國際標準化比值(INR)增加的報告。

併用CYP2D6抑制劑

人類肝臟微粒體離體藥物交互作用研究顯示併用CYP2D6抑制劑如fluoxetine、paroxetine及amitriptyline可能會略微抑制tramadol的代謝。

併用Cimetidine

未研究本品與cimetidine的併用。併用tramadol及cimetidine在臨牀上不會顯著影響tramadol的藥物

動力學。

懷孕、哺乳及生育(依文獻記載)

懷孕

已證明 tramadol 會穿過胎盤。

未對懷孕婦女作過充份且完善對照的研究。

懷孕期間的使用安全性尚未確定。
在懷孕期間延長使用本品或其他鴉片類藥物，可能導致新生兒鴉片類藥物戒斷症狀。特別在懷孕的最後三個月時會增加此風險。

哺乳

因未曾研究本品用於嬰兒及新生兒的安全性，故不建議哺乳的母親使用本品。

生育

尚未評估 tramadol 或 tramadol/acetaminophen 合併使用對人類生育的影響。

對駕駛及使用機械能力的影響

本品可能會減弱病人從事有潛在危險的工作(如駕車或操作機械)所需的心智或生理能力。

不良反應(依文獻記載)

最常被報告的副作用發生於中樞神經系統及胃腸系統。最常被報告的不良反應為噁心、暈眩及嗜睡。此外，常觀察到下列副作用，雖然其發生頻率通常較低：

全身一虛弱、疲倦、熱潮紅。

中樞及週邊神經系統—頭痛、震顫。

胃腸系統—腹痛、便祕、腹瀉、消化不良、脹氣、口乾、嘔吐。

精神異常—厭食、焦慮、迷惑、欣快、失眠、神經質。

皮膚及附屬組織—搔癢、疹、流汗增加。

具顯著臨床意義且至少與本品有關之不常見副作用包括：

全身一胸痛、僵硬、暈厥、戒斷症狀。

心血管疾病—高血壓、高血壓惡化、低血壓。

中樞及週邊神經系統—運動失調、抽搐、張力過強(hypertonia)、偏頭痛、偏頭痛惡化、非自主性肌肉收縮、感覺異常、人事不省、頭暈。

胃腸系統—吞嚥困難、黑糞、舌水腫。

聽覺及前庭異常—耳鳴。

心跳速度及心律異常—心律不整、心悸、心搏過速。

肝臟及膽道系統—肝功能測試異常。

代謝及營養異常—體重減輕。

精神異常—記憶缺失、人格解體、抑鬱、濫用藥物、情緒不穩定、幻覺、陽萎、惡夢、思考異常。

紅血球細胞異常—貧血。

呼吸系統—呼吸困難。

泌尿系統—蛋白尿、排尿異常、寡尿、尿液滯留。

視覺異常—異常視覺。

先前的臨床試驗或上市後曾被報告與 tramadol hydrochloride 有關具顯著臨床意義之其它副作用

與 tramadol 產品有關曾被報告的副作用包括：直立性低血壓、過敏反應(包括類過敏性休克及搔癢、Stevens-Johnson症候群／毒性表皮壞死溶解症候群，即 toxic epidermal necrolysis syndrome 缩寫為 TENS)、認知功能異常、自殺傾向、肝炎、肝衰竭及腸胃道出血。被報告的實驗室異常包括肌酐酸值上升。Tramadol 與其它 serotonin 協同劑如 SSRI 及 MAO 抑制劑併用，曾有 serotonin 症狀的報告(該症狀可能包括發燒、興奮、寒顫及精神激越(agitation))。內含 tramadol 成分的藥品其上市後的使用經驗中，有少數會出現精神錯亂、瞳孔縮小、瞳孔放大以及言語障礙。以及有非常少數的報告出現運動障礙。Tramadol 的上市後藥品監視會出現罕見的 warfarin 作用改變，包括凝血時間增加。服用 tramadol 的病人，曾有很罕見的低血糖的病例報告。大多數的報告發生在有因素性危險因子的病人，包括糖尿病或腎功能不全，或是發生在老年病人。服用 tramadol 的病人，曾有很罕見的低血鈉症和／或抗利尿激素分泌失調症候群(SIADH)的病例報告，通常發生在本身有誘發風險因子的病人(例如老年人或合併使用可能會造成低血鈉症的藥物)才可能會造成低鈉血症。

先前的臨床試驗或上市後曾被報告與 acetaminophen 有關具顯著臨床意義之其它副作用

使用 acetaminophen 後罕發生過敏反應(主要是皮膚疹)或敏感報告，且通常可藉由停藥來控制，且必要時進行症狀治療。曾有數個報告建議 acetaminophen 與 warfarin 類化合物併用可能會產生低前凝血酶症(hypoprothrombinemia)。但在其它研究中，凝血時間未有變化。

雄性激素缺乏 (androgen deficiency)

曾有長期使用 opioid 類藥品發生雄性激素缺乏之通報案例。

過量(依文獻記載)

症狀與徵兆

本品是種複方產品。過量的臨床表現包括 tramadol 毒性的徵象及症狀、acetaminophen 毒性的徵象及症狀或兩者皆有。

Tramadol 過量的初期症狀可能包括呼吸抑制及／或癲癇發作。服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

Tramadol

Tramadol 過量的嚴重潛在後果為呼吸抑制、昏睡、昏迷、癲癇發作、心跳停止及死亡。另外，過量時曾有 QT 延長的案例通報。

Acetaminophen

Acetaminophen 大量過量對某些病人可能會造成肝otoxicity。

Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死、低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

治療

本品單次或多次過量可能是種潛在致命多種藥物過量，情況允許下，建議諮詢適當的專家。治療本品過量，除了一般的支持性療法外，首先要注意保持充分的呼吸暢通，並設法降低藥物吸收。因控制過量的對策正持續地發展中，若有中毒控制中心，建議聯繫之以確定最新的過量建議處置。低血壓的原因通常是循環血量減少，須用液體矯治。視情況給與血管收縮劑及其它支持療法。必要時，須先插入補口狀的內氣管導管，幫助病人呼吸。

Naloxone 雖能治療 tramadol 過量所引起之部分症狀，使用 naloxone 也會增加癲癇發作的危險性。根據 tramadol 的使用經驗，過量時採取血液透析助益不大，因在四小時透析時間所移除的藥物少於攝入劑量的百分之七。

成年病人及兒童病人發生過量時，若不清楚其所攝入之 acetaminophen 量為何或對其攝入時間有疑問或不確定，須測量其 acetaminophen 血漿濃度值並使用 acetylcysteine 治療。若不能進行分析且估計成人和青少年之 acetaminophen 攝入量超過 7.5~10 公克，兒童之 acetaminophen 攝入量超過 150 mg/kg，須投與 N-acetylcysteine 並維持一個完整的療程。

藥理學特性(依文獻記載)

化學名

Tramadol hydrochloride

(±)-cis-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride

Acetaminophen

N-acetyl-p-aminopheno(4-hydroxyacetanilide)

藥效學特性(依文獻記載)

藥理治療分類：止痛藥，鴉片類與非鴉片類複合止痛劑。ATC code : N02AJ13

藥效作用

Tramadol 是種作用於中樞之止痛化合物。至少有兩種互補的作用機轉，原型和活性代謝物(M1)與 μ 鴉片受體連結，對 norepinephrine 及 serotonin 之再吸收有微弱的抑制作用。

Acetaminophen 是另一種作用於中樞之止痛藥物，尚不清楚其止痛作用之確切位置和作用機轉。

使用標準動物模型評估，tramadol 及 acetaminophen 複方有協同作用。

藥動學特性(依文獻記載)

通則

Tramadol 是以消旋物(racemate)給藥，循環中可測得 tramadol 及 M1 之 [-] 和 [+] 型。口服一錠本品後，血漿 tramadol 及 acetaminophen 之藥物動力學如表一所列。與 acetaminophen 相較，tramadol 的吸收較慢且半衰期較長。單次口服一錠 Tramadol/Acetaminophen(37.5mg/325mg)複方錠劑，tramadol 在 1.8 小時後達到最高血漿濃度值 64.3/55.5ng/ml([+]-Tramadol/(-)-Tramadol)，acetaminophen 在 0.9 小時後達到最高血漿濃度值 4.2 μg/ml。[+]-Tramadol/(-)-Tramadol 及 acetaminophen 之平均排除半衰期 t_{1/2} 為 2.5 小時及 2.5 小時。健康自願者單次服用及多次服用本品之藥物動力學未顯示 tramadol 及 acetaminophen 有明顯的藥物交互作用。

表 1：健康自願者單次口服一錠 Tramadol/Acetaminophen 複方錠劑之 Tramadol(+)-及 (-)-鏡像異構物及 M1 和 Acetaminophen 之平均值(±SD)藥物動力學值總表

參數*	(+)-Tramadol	(-)-Tramadol	(+)-M1	(-)-M1	Acetaminophen
C _{max} (ng/mL)	64.3 (9.3)	55.5 (8.1)	10.9 (5.7)	12.8 (4.2)	4.2 (0.8)
t _{max} (h)	1.8 (0.6)	1.8 (0.7)	2.1 (0.7)	2.2 (0.7)	0.9 (0.7)
CL/F (mL/min)	588 (226)	736 (244)	- -	- -	365 (84)
t _{1/2} (h)	5.1 (1.4)	4.7 (1.2)	7.8 (3.0)	6.2 (1.6)	2.5 (0.6)

* Acetaminophen 之 C_{max} 單位為 mcg/ml。

註：上表括弧內之數字代表其前方數字的標準偏差值(SD, standard deviation)。

吸收

單次口服 100 mg 的 tramadol 錠，tramadol hydrochloride 之平均絕對生物可用率約 75%。健康成人服用兩錠本品，約在服藥後兩小時及三小時達到消旋 tramadol 及 M1 之最高血漿濃度。

服用本品，acetaminophen 之口服吸收迅速且幾乎完全吸收，主要是在小腸被吸收。一個小時內達到 acetaminophen 之最高血漿濃度值且不因 tramadol 同時投與而被影響。

食物效應

本品與食物併服不會顯著影響 tramadol 或 acetaminophen 之最高血漿濃度或吸收量，因此本品可在用餐時間單獨服用。

分佈

靜脈注射 100 mg，男性及女性之 tramadol 分佈體積為 2.6 和 2.9 L/kg。Tramadol 與人體血漿蛋白質之結合率約為 20%。

Acetaminophen 可廣泛分佈於大部份的身體組織，脂肪除外。

Acetaminophen 之分佈體積約為 0.9 L/kg。相當小比例(20%)的 acetaminophen 會與血漿蛋白質結合。

代謝

健康自願者服用本品所得之 tramadol 及其 M1 代謝物血漿濃度值，不會明顯異於單獨服用 tramadol 所測得之值。約 30% 的劑量以原型排泄至尿液中，60% 的劑量則以代謝物形式排泄。主要的代謝途徑是在肝臟中進行 N- 及 O-demethylation 及 glucuronidation 或 sulfation。Tramadol 經由多種途徑被代謝，包括 CYP2D6。本身為 CYP2D6 超快速代謝者的病人，相較於其他病人，在轉化 tramadol 成其活性代謝物 M1 可能更快速且完全(請參見警語及注意事項：Tramadol 的 CYP2D6 超快速代謝)。有文獻報導在非歐裔美國人、白人美國人、亞洲人和歐洲人(包含希臘人、匈牙利人、北歐人的專一性研究)等不同種族間，此 CYP2D6 基因型差異的發生率其範圍可由 1%-10% 至高達 29%(非洲裔俄比亞人)。

Acetaminophen 主要在肝臟經由一級(first-order)動力學被代謝，主要包括三種不同的途徑：

a) 與 glucuronide 接合；

b) 與 sulfate 接合；及

c) 經由 cytochrome P450 酶素途徑氧化。

排除

Tramadol 及其代謝物主要是經由腎臟排除。消旋 tramadol 及 M1 代謝物之血漿排除半衰期約為 6 小時及 7 小時。

本品多次投與時，消旋 tramadol 的血漿排除半衰期會由約六小時增至七小時。成人的 acetaminophen 半衰期約為 2~3 小時。兒童的 acetaminophen 半衰期值較短，但新生兒及肝硬化病人的 acetaminophen 半衰期值較長。

Acetaminophen 自體內排除主要是經由與劑量有關的模式形成 glucuronide 及 sulfate 接合物。低於 9% 的 acetaminophen 是以原型排泄至尿中。

非臨床資料(依文獻記載)

Tramadol/Acetaminophen 複方

未對 tramadol 及 acetaminophen 複方產品做過動物或實驗室研究以評估其致癌性、遺傳突變性或生育力不全。大鼠口服 tramadol 及 acetaminophen 複方未觀察到其後代有藥物相關之致畸胎作用。大鼠服用 8.3 倍人類最高劑量之母體毒性劑量(50/434 mg/kg tramadol/acetaminophen)，發現 tramadol/acetaminophen 複方藥物有胚胎性及胎毒性，但此劑量未有致畸胎毒性。胚胎性及胎毒性會造成胎兒體重減輕及額外肋骨增加。較低及且不嚴重的母體毒性劑量(10/87 及 25/217 mg/kg tramadol/acetaminophen)不會發生胚胎性或胎毒性。

Tramadol Hydrochloride

致癌性／致突變性

老鼠致癌性研究會觀察到輕微但具統計意義的兩種常見之鼠類腫瘤，肺部及肝臟，特別是年長的小鼠(服用高達 30 mg/kg 的劑量約兩年，雖然這個研究未使用最高耐受劑量)。該發現不被視為 tramadol 對人類會造成危險性。大鼠致癌性研究未有此發現。

Tramadol 在下述分析未有致突變性：Ames Salmonella 微粒體活化試驗、CHO/HPRT 哺乳細胞分析、老鼠淋巴瘤分析(未有代謝活化)、小鼠之主要致死突變、中國田鼠之染色體畸變試驗及小鼠和中國田鼠之骨髓微核體研究。

老鼠淋巴瘤分析及小鼠微核體試驗若有代謝活化作用，每週會出現突變結果。總而言之，這些試驗所得之結果顯示 tramadol 對人類沒有遺傳毒性。

生育

公鼠及母鼠口服 tramadol 劑量高達 50 mg/kg 及 75 mg/kg 未觀察到生育力會受影響。

野生種之影響

曾以 tramadol 對大鼠做過出生前及出生後之評估。母體口服(灌食)50 mg/kg 或更高的劑量其後代之體重會減輕，且哺乳初期服用 80 mg/kg 的劑量(6~10 倍之最大人體劑量)會降低幼鼠存活率。母體服用 8、10、20、25 或 40 mg/kg 的劑量，其後代未觀察到毒性。在該試驗中，tramadol 所有劑量皆觀察到母體毒性，但是僅有在較高劑量時才會對後代有顯著的影響，此時母體毒性亦較嚴重。

配伍不相容性

未知。

儲存條件

30°C 以下

包裝

2-1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第 057779 號
GMP 優良藥品 G-11815 號
經衛生署核准為 BE 藥品



通過 PIC/S GMP 優良藥廠
五洲製藥股份有限公司

桃園市新屋區赤欄里 17-1 號

I125
v4.00