尺寸：9.8x14cm
顏色：PANTONE RED 032CV
PANTONE PROCESS BLACKCV

衛署藥製字第057970 號
G-11988 Code No.31333

善　瞳 眼藥水 0.125%

Santone Ophthalmic Solution 0.125%

【說明】
本品是一種無菌使用於眼部之局部抗乙醯膽胺作用劑。
【臨床藥理】
本品是一種 Anticholinergic 劑，由節後膽鹼神經直接作用於平滑肌和淚腺，它們的藥理作用是由於阻止乙醯膽胺的類副交感神經作用。
【成分】
Each ml Contains：
Atropine Sulfate..... 1.25mg
賦形劑：Benzalkonium Chloride、Sodium Phosphate Dibasic 12H_2O、Sodium Phosphate Monobasic 2H_2O、Glycerin、Hydroxypropyl Methylcellulose、Hydrochloric Acid、Sodium Hydroxide、Water for injection
【適應症】
散瞳、睫狀肌麻痺。
【用法用量】
1.用於睫狀肌麻痺性折射(屈光)時：
局部用於粘膜，1 天1 ~ 2 次，每次 1 滴。
(1) 嬰兒(大至 1 歲)：使用濃度：0.125%，或由醫師指示使用。
(2) 小孩(1 至 5 歲）：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。
(3) 小孩(5 歲和大於5 歲，且是藍虹膜者）：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。
(4) 小孩(5 歲和大於5 歲，且是暗虹膜者）：使用濃度：0.5% 或 1 %，或由醫師指示使用。
2.用於葡萄腹炎時：局部用到結膜，使用濃度：0.125% 到 1 %，1 天 1 ~ 3 次，每次 1 滴。
3.用於手術後瞳孔放大時：局部用到結膜，使用濃度：0.5% 或 1 %，1 天 1 ~ 3 次或由醫師決定，每次 1 滴。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】
1.本品不能用於青光眼，或者有窄角性青光眼傾向之病人。
2.本品不能用於先前對 Atropine 產生嚴重全身反應之小孩。

【注意事項】
本品應置於小孩拿不到的地方。
【致癌性、突變性、不孕症】
還沒有產生這些病例之研究報告。
【懷孕婦女】
1.本品還未做動物生殖研究，也不知道是否能夠造成胎兒傷害，或影響生殖能力。
2.本品可應用於孕婦(僅當清楚需要時)。
【幼兒】
請看禁忌和警告部份。
【警語】
過量使用於小孩和對某特定過敏體質者，可能會產生全身中毒時症狀時，應停止使用和使用適當藥物，如述於"過量"部份治療。
【副作用】
1.長久使用時可能引起全身反應，眼瞼過敏反應，局部刺激、充血、瞳大、結膜濾泡增殖炎或者皮膚炎。
2.使用時，會有畏光及近距離調節力不足之現象。
【過量】
一般症狀和 Atropine 中毒症狀，包括：口乾、皮膚過敏、發燒、精神錯亂、心悸、臉部發紅，如果有過量現象，應使用水或 0.9% 食鹽水沖洗，必要時可用縮瞳劑。
如果意外攝取時(吞食時):
1.使用 4% 單寧酸使之嘔吐或洗胃。
2.使用 5mg 之毛果芸香鹼(Pilocarpine)口服直至口濕潤為止(必要時間隔投與)。
假使需要全身支持措施時：如下
1.呼吸衰竭時：氧氣筒和人工呼吸。
2.尿液滯留時：插入導管倒尿。
3.發燒：用酒精擦拭。
當用於已用短作用之 Barbiturates 鎮靜劑為控制刺激(Excitement)狀態時，須非常小心。

【包裝貯存】
100 毫升以下塑膠瓶裝，請貯存於 25℃ 以下避光處。

1512-01

Made in Taiwan

溫士頓醫藥股份有限公司
Winston
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號