

消化・整腸・營養

# 若元胃腸錠

wakamoto  
STRONG

衛署藥輸字 第007216號

“若元胃腸錠”是一種具有消化、整腸、營養三項作用之胃腸藥，健康的食慾得依靠正常的消化與吸收機能來支持，〈胚芽培養法〉所產生的消化酵素可以促進胃腸之消化作用，減輕胃腸之負擔。乳酸菌可以調整胃腸機能使之正常，進而能恢復胃腸之正常吸收能力。

## “若元胃腸錠”有下列三種作用：

1. **消 化**：“若元胃腸錠”所使用之*Aspergillus oryzae-NK*菌是麴菌之一種，是以穀類的胚芽當培養基，培養時產生下列各種消化酵素：碳水化合物消化酵素Diastase、蛋白質消化酵素Protease、脂肪消化酵素Lipase。
2. **整 腸**：“若元胃腸錠”所使用之乳酸菌是*Streptococcus faecalis*菌之一種，能抑制引起胃腸疾患之有害細菌之繁殖，調整腸機能、改善便祕、下痢、消化不良等症狀，促進腸對營養物之吸收，而使衰弱的胃腸機能恢復健康。
3. **營 養**：當胃腸機能衰弱或病後衰弱，無法從食物中充分的補給營養時，“若元胃腸錠”中之消化酵素、乳酸菌所用來當培養基之胚芽及所配合之酵母含有維他命群、礦物質、胺基酸等營養素可以幫助營養之補給，而減輕胃腸機能之負擔。

## ● **Aspergillus oryzae-NK菌（消化酵素產生菌）培養末：**

*Aspergillus oryzae-NK*菌是製造消化酵素之菌種，此菌當培植於穀類胚芽中，利用胚芽當培養基增殖，即產生 Diastase 、Protease 、Lipase 等等消化酵素，此等消化酵素保持以胚芽培養之狀態下之培養末做成錠劑，可以長時間維持其消化能力。

## ● **乳酸菌培養末：**

“若元胃腸錠”中所含之乳酸菌是以胚芽當培養基增殖生成，以活性狀態下作成錠劑，此乳酸菌有整腸作用。

## ● **酵母（維他命加強）及胚芽：**

酵母具有與動物性蛋白質相似之胺基酸，含有大量維持生命所必須之胺基酸，更重要的在營養學上有維他命B<sub>1</sub>、維他命B<sub>2</sub>及菸鹼醯胺之配合，再者胚芽含有維他命群及礦物質，這些營養素能使衰弱的胃腸機能得到充分之營養補給。

## 【組 成】

消化酵素	乳酸菌	胺 基 酸		維 他 命	礦 物 質
Diastase	<em>Streptococcus faecalis</em> 菌	Methionine	Glutamic acid	Vitamin B <sub>1</sub>	Calcium
Protease		Lysine	Phenylalanine	Vitamin B <sub>2</sub>	Potassium
Acidic Protease		Leusine	Threonine	Nicotinamide	Sodium
Lipase		Isoleusine	Cystine	Vitamin B <sub>6</sub>	Phosphorus
Invertase		Tryptophan	Serine	Vitamin B <sub>12</sub>	Iron
Phosphatase		Valine	Histidine	Pantothenic acid	Magnesium
		Glycine	Arginine	Folic acid	Aluminum
		Proline	Aspartic acid	Biotin	
				Inositol	
				p-Aminobenzoate	

## 【成 份】

有效成分及含量：27錠(成人一日量)中含有

- **Aspergillus oryzae-NK菌（消化酵素產生菌）培養末** ... 3375.0mg
- 乾燥酵母 ..... 2490.1mg
- 乳酸菌胚養末 ..... 675.0mg
- 維他命B<sub>1</sub> (Thiamine Nitrate) ..... 3.4mg
- 維他命B<sub>2</sub> (Riboflavin) ..... 2.0mg
- 菸鹼醯胺 (Nicotinamide) ..... 2.0mg

其他成分(賦形劑)

- Precipitated Calcium Carbonate

## 【用途(適應症)】

消化不良、食慾不振、胃腸內異常發酵、便祕。

## 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：  
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 三、其他使用上注意事項：
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。
  - (四) 小孩服用本藥應在大人指導下服用，未滿五歲之兒童服用時請將藥片磨碎後服用。

## 【用法用量】

年齡	用法用量
15歲以上	一次9顆
11歲以上未滿15歲	一次6顆
8歲以上未滿11歲	一次5顆
5歲以上未滿8歲	一次3顆

## 【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部份	副作用
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

若有任何不適情況產生。  
連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

## 【包 裝】

2錠~1000錠<瓶裝>  
9錠/包<盒裝>

## 【儲存條件】

保存於25°C以下避光乾燥處



WAKAMOTO Pharmaceutical Co., LTD.

Sagami Ohi Factory

378, Kanate Aza Minami, Ohi-machi Ashigarakami-gun,  
Kanagawa Prefecture, Japan

藥 商



大法貿易股份有限公司

台北市忠孝東路四段107號8樓-1

(02)2763-7101