

「陽進堂」佑你胃腸膠囊

YOUMATYL CAPSULES

衛署藥輸字第 010011 號

【禁忌】：（下列患者請勿服用）

疑似有親鉻細胞瘤（Phenochromocytoma 或 Phaeochromocytoma）之患者。〔可能引起急性升壓〕

【組成・性狀】：

1. 組成：每顆膠囊中含有 sulpiride 50mg，膠囊本身含有添加物 sodium lauryl sulfate。

2. 性狀：白色粉末充填於膠囊蓋及膠囊體皆為白色不透明的硬膠囊。

識別代碼：YD286

【適應症】：

本藥須由醫師處方使用。

精神病狀態、消化性潰瘍。

【用法・用量】：

胃・十二指腸潰瘍：

sulpiride 通常成人每日 150mg，分 3 次口服。

得依年齡、症狀做適宜增減。

精神分裂症：

sulpiride 通常成人每日 300~600mg，分次口服。

得依年齡、症狀做適宜增減。可增量至每日

1200mg 為止。

憂鬱症、憂鬱狀態：

sulpiride 通常成人每日 150~300mg，分次口服。

得依年齡、症狀做適宜增減。可增量至每日

600mg 為止。

【使用上的注意事項】：

1. 慎重服用（下列患者請慎重服用）

(1) 疑似或患有心血管疾病、低血壓的患者。

〔可能使症狀惡化〕

(2) 腎障礙患者。〔可能持續高血中濃度〕

(3) 帕金森氏症患者。〔可能使錐體外路症狀惡化〕

(4) 伴有脫水、營養不良症狀身體衰弱的患者。

〔易引起 Malin 氏症候群（Malin's syndrome）〕

(5) 高齡者（參照「高齡者服用」項）。

(6) 小兒（參照「小兒服用」項）。

2. 重要基本注意事項

(1) 因服用本劑會產生內分泌機能異常（催乳激素濃度升高）、錐體外症狀等副作用，故服用本劑時，需充分考量其有效性與安全性後再使用。

(2) 有時會導致暈意或目眩等症狀，正服用本劑的患者應注意不要從事駕車等具危險性的機械操作。

(3) 因具有止吐作用，會使因其他藥物中毒、腸閉塞、腦腫瘍等的嘔吐症狀不明顯，應特別注意。

3. 相互作用（應注意併用狀況）

藥劑名	臨床症狀・處置方法	機轉・危險因子
Digitalis 劑 Digoxin Digoxin 等	可能使作為 Digitalis 劑飽和時指標的噁心、嘔吐、食慾不振症狀不顯性化。	因本品的止吐作用。

Benzamide 類藥 物、Metoclopramide、Tiapride 等、Phenothiazine 類藥 劑、Chlorpromazine 等、Butyrophenone 類藥物、Haloperidol 等	變得容易發生內分泌機能異 常、錐體外症狀。	由於本品或這些藥物具有抗 dopamine 作用，併用會使抗 dopamine 作用增強。
中樞神經抑制劑、Barbituric acid 誘導 體、麻醉劑等	會相互作用使中樞神經抑制 作用增強。	由於本品或這些藥物具有中 樞神經抑制作用。
Dopamine 作用劑、Levodopa 等	會相互作用產生減弱作用。	由於本劑具有抗 dopamine 作 用，會產生拮抗作用。
Alcohol、飲酒	會相互作用使中樞神經抑制 作用增強。	同時具有中樞神經抑制作 用。

4. 副作用

(1) 重大副作用（頻率不明）

1) Malin 氏症候群（Malin's syndrome）

由於會出現 Malin 氏症候群：無動緘默、強度的肌肉強直、吞嚥困難、頻率、血壓變動、出汗等，接著出現發燒現象時，應停止服用，進行身體降溫、水分補充等適切處置。本症狀發生時，多出現白血球增加或血清 CPK 上升，亦會出現伴隨肌紅蛋白尿（myoglobin）的腎機能降低。但報告指出有轉變為持續高燒、意識障礙、呼吸困難、循環虛脫、脫水症狀、急性腎不

全而死亡的病例。

2) 痙攣

會出現痙攣症狀。出現此症狀時應停止服用。

3) 遲發性運動障礙

由於長期服用，會出現口部周圍的不隨意運動，即使停止服用後仍可能持續出現，所以應仔細觀察，認定有異常時，須做適切處置。

(2) 其他副作用

胃・十二指腸潰瘍時：

	頻率不明
內分泌 ^{註1)}	月經異常、乳汁分泌、女性化乳房
錐體外症狀 ^{註2)}	震顫、說話不清楚、焦躁感
精神神經系	失眠、困意、目眩、搖晃不穩
消化器	口渴、胸口灼熱、噁心、嘔吐、便秘
其他 ^{註3)}	熱感、倦怠感、發疹、浮腫、

註1)應仔細觀察，一旦有異常發生時，立刻停止服用。

註2)發生此類症狀時，應立即停止服用。

註3)出現發疹、浮腫時，應立即停止服用。

精神分裂症、憂鬱症、憂鬱症狀時：

心血管系統 ^{註1)}	血壓下降、心電圖異常、血壓上升、胸部苦悶、頻脈
----------------------	-------------------------

錐體外症狀 ^{註2}	帕金森氏症候群（震顫、肌肉強直、流口水等）、運動障礙（說話不清楚、言語障礙、頸肌扭轉、眼睛旋轉、注意痙攣、下嚥困難等）、無法靜坐
內分泌 ^{註3}	乳汁分泌、女性化乳房、月經異常、無法射精
精神神經系	睡眠障礙、不穩、焦躁感、困意、頭痛、頭重、目眩、浮游感、興奮、躁急狀態、麻痺、運動失調、健忘、發呆、徘徊、好動、缺乏抑制（lack of suppression）、無慾狀態
消化器	噁心、嘔吐、口渴、便秘、食慾不振、腹部不舒服、下痢、胸口灼熱、腹痛、食慾亢進
肝臟	GOT、GPT、Al-P 等上升
皮膚 ^{註4}	發疹、搔癢感
眼	視力障礙、眼球冷感、重感、眼睛閃爍
其他 ^{註5}	體重增加、浮腫、無力感、倦怠感、排尿困難、性慾減退、頻尿、腰痛、肩膀酸痛、熱感、發熱、發汗、鼻塞

註1)急遽增量時，心電圖上會出現變化，應慎重服用。

註2)出現此類症狀時，應作減量或併用帕金森氏劑等適切處置。

註3)出現此類症狀時，應仔細觀察，慎重服用。

註4)出現此類症狀時，應停止服用。

註5)出現浮腫時，應停止服用。

5. 高齡者的服用

本劑主要會從腎臟排泄，由於高齡者的腎臟機能較差，易持續血中高濃度，故應注意副作用的發生（錐體外症狀等），及用量與服用間隔等，慎重服用。

6. 孕婦、產婦、哺乳中婦女等的服用

(1)孕婦等

孕婦或可能已懷孕的婦人，只限於治療的有益性遠大於危險性時方可使用。〔懷孕中服用的安全性尚未確立〕

(2)哺乳中婦女

哺乳中婦女應避免服用，不得已情況下須服用時，應停止哺乳。〔報告指出會移轉至母乳中〕

7. 小兒等的服用

對於小兒等的有效性及安全性尚未確立。
（使用經驗少）

8. 過量服用

徵狀、症狀：會出現帕金森氏症候群等的錐體症狀及昏睡症狀。

處置：主要進行對症療法及維持療法（輸液等）。

9. 使用上的注意事項

交付藥劑時，應指導病患 PTP 包裝的藥劑須從 PTP 鋁箔片中取出服用。（報告曾指出因誤食 PTP 鋁箔片後，其堅硬的銳角會刺入食道黏膜，引起穿孔，併發縱膈膜炎等嚴重併發症）。

10. 其他注意事項

(1)依據動物慢性毒性試驗報告指出會導致精巢萎縮；生殖試驗報告指出會引起受孕率降低。

(2)依據大鼠 40mg/kg/日 以上及小鼠 600mg/kg/日 以上長期口服試驗報告指出，腦下垂體、乳腺等發生腫瘤的頻率與對照群相較，結果為較高。

【有效成份相關的物理化學知識】：


一般名：Sulpiride

化學名：N-〔(1-ethyl-2-pyrrolidiny) methyl〕-
2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide

分子式：C₁₅H₂₃N₃O₄S

分子量：341.43

構造式：



性狀：

白色結晶粉末，無臭。易溶於冰醋酸或稀醋酸
略溶於甲醇，微溶於乙醇或丙酮，幾不溶於

水、氯仿、乙醚。溶於稀鹽酸或 0.05mol/L 硫酸
試液。

溶點：175~182°C (分解)

【貯存】：

避免受潮保存。

【包裝】：

PTP 20 粒、60 粒、100 粒、500 粒、1000 粒盒裝。

製造廠：株式會社 陽進堂

Yoshindo inc.

廠址：日本國富山縣婦負郡婦中町萩島 3697 番地 8 號

3697-8 Haginoshima Fuchu-machi Neigun Toyama JAPAN.

藥商：芳鑫貿易有限公司

地址：台北市南京西路 1 號 6 樓 601 室