

Methopt Eye Drops

目舒眼藥水

衛署藥輸字第 10465 號

成分：

每公撮含有：

Hydroxy propyl methyl cellulose (Hypromellose)	5 mg (0.5%)
Benzalkonium chloride 50%	0.4 mg
Disodium edetate	0.5 mg
Disodium hydrogen phosphate	11.8 mg
Sodium dihydrogen phosphate	5.2 mg
Sodium chloride	5.2 mg
Freshly distilled water added to	1.0 mL

適應症：暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

說明：本劑為眼睛滋潤劑，可解除乾眼症的不適和刺激。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

用法用量：需要時使用，每次 1~2 滴。

注意事項：

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、使用前，請洗淨雙手。
- 四、請依照藥品標示使用。
- 五、過期眼藥水請勿使用，開瓶 30 天後請勿使用。
- 六、藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- 七、為避免污染藥品，使用時請勿碰觸藥瓶口。
- 八、使用兩種眼藥水時，請至少隔 5 分鐘後點藥。
- 九、使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏，並至少間隔 10 分鐘後點藥。

警語：一、以下情況應停藥立即就醫：

- (A) 連續使用 3 天（或 72 小時）症狀未解除。
 - (B) 使用後產生眼睛劇痛，視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (C) 發生過敏反應。
 - (D) 青光眼（Glaucoma）患者。
- 二、對本藥之主成分、防腐劑或賦形劑過敏者，不推薦使用。
 - 三、對正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

包裝：15 公撮塑膠滴瓶。

製造廠名：Sigma (Pharmaceuticals) Pty. Ltd.

廠址：1408 Centre Road, Clayton 3168, Australia

藥商：恆振企業有限公司 台北市永吉路 302 號 4 樓之 2