衛署藥輸字第 011900 號

持續性黃體荷爾蒙製劑

持續性 普保胎 注射液

Progeston Depot Intramuscular 125mg

一般 Progesterone 油性劑，一次大量投與在體內也很快被排泄失去其作用，故要維持長時間的有效血中濃度很困難，而黃體荷爾蒙劑適應症，常都須長期治療。為達此目的而發展出本劑一強力之持續性黃體荷爾蒙製劑，其藥效持續 8-10 日，此種持續性藥效與高濃度的製劑，對於女性因黃體荷爾蒙不足所引起之諸症候，具有優越的治療效果。

本劑無不良副作用，它可用於孕婦，而對子宮內之胎兒無不良引響。

成分

每安瓿（1ml）含有 Hydroxyprogesterone Caproate 125mg。
為淡黃色油性澄明注射液。

賦形劑

Benzyl Alcohol 20mg
Benzyl Benzoate 30% ..... 適量
Sesame Oil 70% ..... 適量

適應症

無月經、機能性子宮出血、黃體機能不全不妊症、危迫流產、習慣性流產。

用法用量

本藥限由醫生使用。
通常成人一週一次 Hydroxyprogesterone Caproate 量 65-125mg，肌肉注射。

注意事項

1. 患有嚴重之肝障礙及肝疾患者，請勿使用。
2. 患有心疾患、腎疾患或有此等症狀之既往歷之患者（或有鈉或體液貯留之現象）請慎重使用。
3. 副作用：
   (1) 過敏症：如有發疹等過敏症 ，請停止使用。
   (2) 肝臟：偶有肝機能異常之現象發生，請注意觀察，如有此現象請減量使用或暫時停藥。
   (3) 電解質代謝：偶有浮腫、體重增加等症狀之發現，請注意觀察，如有此現象，須減量使用或暫時停藥。
   (4) 精神神經系：偶有頭痛、嗜睡等症狀之發生。
   (5) 其他：偶有倦怠感發生。
4. 使用上之注意：
   (1) 有產生局部硬結的可能。
   (2) 肌注時請注意下列事項：
      1. 避開神經走行部位
      2. 如需連續使用請左右邊交互注射。
      3. 請確實觀察注射器反吸時無血液逆流現象。
5. 其他：
   黃體荷爾蒙劑之使用與先天異常兒之出生無因果關係，但對於曾經生過心臟、四肢等之先天異常兒之母親與對照群相比，其於妊娠初期使用黃體荷爾蒙劑者其比率略有差別，此乃免疫學調查之報告。

包裝

每安瓿 1 公撮，100 安瓿以下盒裝。
每小瓶 5 公撮，每小瓶 10 公撮，100 小瓶以下盒裝。

製　造　廠：富士製薬工業株式會社
製造廠廠址：富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地
藥　　商：一成藥品股份有限公司
地　　址：新北市汐止區新台五路一段77號20樓