

# 優斯特蒙注射劑

## Ustimon<sup>®</sup> Ampoules

衛署藥輸字第 013735 號

擴張冠狀動脈

改進心肌氧氣的利用

每安瓿中含：

10 mg N, N' - dimethyl - N, N' - [ 3 - ( 3', 4', 5' - trimethoxy - benzoxy ) - propyl ] - ethylenediamine - dihydrochloride (Hexobendine)

【作用】：

優斯特蒙 (Ustimon) 具有長時而強力的冠狀動脈擴張作用，改進心肌氧氣的利用，增加冠狀動脈的血流。由冠狀動脈所引發的心絞痛無論其發作次數和強度皆顯著的減少，心肌的功能則明顯的增加。

【適應症】：

冠狀動脈和心肌循環失調。

【劑量】：

平均劑量為每日服藥 2-3 次，每次 1-3 片，服 2-3 星期。嚴重病例，每日注射用藥 1-2 次，每次肌肉注射 1 安瓿或靜脈注射 1/2 安瓿。

或每日肌肉注射 1/2 至 1 安瓿，再日服 1-2 次，每次 1 片，以三星期為一治療程。

錠劑須由醫師處方使用。

注射劑限由醫師使用。

優斯特蒙 (Ustimon) 無禁忌症。

【副作用】：

在用藥劑量下，罕有副作用產生，偶有輕微之心率增加現象。

【注意事項】：

1. 本品用於減少心絞痛發作之次數及減輕發作之症狀，但急性發作時，應採用三硝基甘油等速效性藥劑。
2. 若有副作用產生，應減低治療劑量，可緩和副作用之產生，或以停藥方式，以使副作用自然消失。
3. 本品若與其他冠狀血管擴張劑合併使用，應注意劑量之控制，本品亦可與毛地黃劑合併使用。

【包裝】：

每支 2 公撮，100 支以下安瓿裝。

製造廠：Nycomed Austria GmbH

St. Peter Stra ß e 25, 4020 Linz, Austria

藥 商：吉發企業股份有限公司

地 址：台北市愛國西路 9 號 2 樓之 9

電 話：(02)23613040, 23618588

傳 真：(02)23619879