

# 成藥藥品仿單標籤粘貼表 (二)

藥品名稱	得脫蘇爾注射劑	申 請 商	恆通行股份有限公司
衛生署 給證號碼	衛署藥輸字第013917號		

日本藥局方  
Sodium Thiosulfate Injection

衛署藥輸字第013917號  
本藥限由醫師使用

813925



日本藥  
1ml 中

## 得脫蘇爾注射劑 DETOXOL

Ravaut氏於1920年報告硫代硫酸鈉(Sodium Thiosulfate)對於由砒霜劑，特別是由Arsenobenzol(606)劑引起的皮膚炎有效以來被採用為砒霜劑之解毒劑，後來亦被採用為氯化氫(Hydrogen Cyanate)中毒的解毒劑。

### 【組成・性狀】

本剤在化學上為純粹的硫代硫酸鈉(Sodium Thiosulfate)之10%無色透明之注射用蒸餾水溶液。

分子式： $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$   
分子量：248.18  
pH：6.8—8.5  
浸透圧比：約3

### 【作用】

氯化氫(Hydrogen Cyanate)中毒時之解毒機構是被認為由其生成無毒的硫氨酸鹽(Hiocyanate)而來的。

其對砒霜性肝炎有效，被認為可能是由分解而使本剤所生成膠性游離所致。

### 【適應症】

重金屬中毒症

說明：氯(Cyanogen)以及氯化物中毒症  
砒霜(砷)劑中毒症。

### 【用法・用量】

作為硫代硫酸鈉(Sodium Thiosulfate)成人通常每日1~2g(公克)靜脈內注射。

對氯以及氯化物中毒，成人通常1次注射12.5~25g(公克)於靜脈內。但，視年齡及症狀，可適宜增減劑量。

### 【使用上之注意】

#### (1)副作用

過敏症：因有發生過敏症狀之可能，如發現此症狀時應即停止使用。

#### (2)使用上之注意

當注射本剤時，應盡量降低注射之速度。

#### (3)其他注意事項

連續使用本剤時，其效力有逐次降低之傾向，因此注射本剤達到7~10次後，應適宜停藥為佳。

### 【注意】

(1)本剤如發生沈澱或混濁時請勿使用。

(2)本藥限由醫師使用。

### 【包裝】

每支20公撮 5,50安瓿裝。



製造發売元 萬有製藥株式會社

東京都中央区日本橋本町2-7  
電話 東京(270)7551(大代表)

恒通行股份有限公司

台北市重慶南路一段111號  
電話 台北(02)311-5274-5

74.10.6

