

好泌隆錠 便秘治療藥

Haminon

衛署藥輸字第018294號

通便是保持身體的正常健康要事，凡日常生活不規律、運動不足、纖維質食物攝取不足，或高齡者大腸蠕動不夠，會造成便秘。便秘更會引起食慾不振、頭痛、皮膚粗糙、痔瘡等等不便的症狀。

Haminon 含有會促進大腸粘膜及正常蠕動作用的Bisacodyl成份，對胃及小腸不會產生作用，但對於大腸則具腸溶劑的選擇性效果。

Haminon 於就寢前服用及第二天早上吃早餐前服用，服六個小時左右會發生效果。

【主成分】

每粒含：Bisacodyl 5mg

【賦形劑】

Lactose, Hydroxypropyl cellulose low substitutive, Hydroxypropyl cellulose, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl cellulose, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose 2910, Hydroxypropylmethylcellulose acetate succinate, Triethyl citrate, Carnauba wax, Officially designated coal-tar color

【適應症】

便秘

【用法、用量】

每日一次（就寢前或者空腹時）以水或湯服用

便秘的程度	15歲以上	11歲～15歲
2～3日無通便	1～2錠	1錠
4日以上無通便	2～3錠	1～2錠

第一次使用以上述量劑為準，通便後則減量服用
本藥須經醫師指示使用。

【使用上注意事項】

1.下列人士在服用前先請教醫生或藥師。

(1)劇烈腹痛、嘔吐者。

(2)孕婦。

(3)正在接受其它藥物治療者

2.服用之際，請注意：

(1)遵守本處方用法及用量。

(2)切勿同時服用其他的腹瀉劑。

(3)本藥劑是屬於腸溶劑請勿碾碎服用，勿同時服用制酸劑或牛奶。

3.服用中及服用後請注意如下：

(1)若服用本藥劑期間，有腹痛、下瀉、嘔吐等狀況時，立刻停止服用，並請教醫生或藥師。

(2)服用1週後仍無改善便秘狀況，則停止服用，並請教醫師或藥師。

4.保管及取用上應注意：

(1)放在小孩子觸摸不到之處。

(2)勿放置在日光直射之處，最好放在濕氣少而保持涼爽之處。

5.本劑是多層的腸溶性錠劑，外觀的顏色多少會有差異；此外，保存條件（光、溫度、溼度等）不同時，錠劑顏色亦會變淡，但藥效不會改變。

【包裝】

4-1000粒盒裝

【如何通便】

- 每天有規律地排便是最重要的，請每天早上在一定時間內上廁所。
- 多食用纖維質豐富的蔬菜、水果、並多喝水，適度的運動及腹部按摩。
- 每天早起時多喝冷水及牛乳等，以促進通便。

製造廠：堀井藥品工業株式會社
日本大阪市中央區內淡路町1丁目2番6號

總代理：登喜有限公司
台中市南屯區大墩14街190號2樓

便秘治療薬

ハミノン®

LAXATIVE haminon

身体の健康を正常に保ってゆく上で大切ななものに便通があります。日常の生活が不規則になったり、運動不足、纖維質食物の摂取不足、あるいは高年齢者の場合等に大腸の運動が不十分となり、便秘がおこることがあります。また、便秘がつづくと食欲不振や頭重、肌あれ、吹出物といった不快な症状があらわれやすくなります。

ハミノンは、直接大腸粘膜に作用して、正常なぜん動運動をおこせるピサコジルを主成分とするピンク色の錠剤で、胃、小腸では作用せず、大腸で効果をあらわす腸溶性の緩下剤です。

ハミノンは、就寝前に服用すると翌朝に、また朝食前に服用した場合は、服用後通常6時間前後に効果があらわれます。

〔成 分〕 3錠中

ピサコジル [2-(4,4-ジアセトキシジフェニルメチル)-ピリジン]15mg

〔適 応 症〕

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲減退、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔

〔用法・用量〕

下記の用量を1日1回就寝前（または空腹時）に水または湯とともに服用してください。

便秘の程度	15才以上	11才以上15才未満
2～3日便通のない時	1～2錠	1錠
4日以上便通のない時	2～3錠	1～2錠

ただし、初回は上記最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ増量または減量してください。

〔使用上の注意〕

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある方。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる婦人。
- (3) 医師の治療を受けている方。

2. 服用に際して、次のことに注意してください

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 他の瀉下薬（下剤）とは同時に服用しないでください。
- (3) 本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また制酸剤又は牛乳と一緒に服用しないでください。

3. 服用中又は服用後は次のことに注意してください

- (1) 本剤の服用により、はげしい腹痛、下痢、嘔吐等があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (2) 1週間位服用しても便秘の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光を避け、なるべく湿氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

5. その他

本剤は多層の腸溶性フィルムコーティング錠ですので、錠剤の色が多少異なることがあります。また、保存条件（光、温度、湿度）等により、錠剤のピンク色が薄くなることがありますが効果には変わりありません。

〔包 装〕 (PTP包装) 60錠・120錠・1200錠

「便秘しがちな方のために」

- ◎規則的な排便習慣をつけることが大切で、毎朝時間をきめて一定時間トイレに入るように心がけて下さい。
- ◎纖維質の多い野菜や果物、また水分を多くとるように心がけて下さい。
- ◎適度な運動や腹部マッサージなどを行いうよう心がけて下さい。
- ◎朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意を促しやすくなります。

製造発売元



堀井薬品工業株式会社

本社 大阪市中央区内淡路1丁目2番6号

6305N