安那膚軟膏

Triple Antibiotic Ointment

衛署藥輸字第 019178 號

【作用】本產品是由三種抗生素混合製成的局部治療劑。

Bacitracin：為多胜類抗生素，可妨礙細菌細胞膜的合成，其主要作用是抗革蘭氏陽性及革蘭氏陰性菌病原。

Neomycin：可阻礙蛋白質的合成，有效對抗革蘭氏陽性菌。

Polymyxin-B-Sulfate：對革蘭氏陰性菌感染有效。

【有效成分及含量】每gm含：

Bacitracin	**400units**
Neomycin Sulfate eq. to Neomycin	**3.5 mg**
Polymyxin-B-Sulfate	**5000 units**

【其他成分(賦形劑)】COTTONSEED OIL、OLIVE OIL、 Vitamin E (as dl-α -Tocopheryl Acetate)、SODIUM PYRUVATE、COCOA BUTTER、WHITE PETROLATUM

【用途(適應症)】緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者請勿使用：

（一）曾因本藥成分引起過敏。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

（一）3歲以下

（二）有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

（一）兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

（一）為防止兒童誤食請妥善保管。

（二）避免陽光直射。

（三）勿超過建議使用量或使用次數。

（四）使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨再用藥。

（五）使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

（六）本藥限於皮膚外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），濕疹、潰爛、龜裂、或嚴重外傷的陰部。

（七）請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

（八）本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。

（九）使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

（十）請勿使用超過7天以上。

【用法用量】

每日1-3次	局部清潔後，適量均勻塗抹(撒佈或噴灑)於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	**副作用**
皮膚	**發疹等過敏性皮膚炎**
耳朵	**耳毒性**
腎臟	**腎毒性**

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用並接受醫師診治：

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁管裝。

【貯存】請存於 15~30℃之室溫下。

【諮詢專線】02-29229350

【製造廠】Perrigo New York INC.

【製造廠地址】1700 Bathgate Ave. Bathgate Industrial Park Bronx, N.Y.10457 U.S.A.

【藥商】大啟藥品有限公司

【藥商地址】新北市永和區中正路 602 巷 1 號 11 樓之 5