

爾康寧錠6.4毫克 Nitrocontin™ Continus® Tablets 6.4 mg

衛署藥輸字第020630號
本藥須由醫師處方使用

〈外觀〉

本品為一平滑、錠劑邊緣有小傾斜的粉紅色持續性藥效錠。
每錠含nitroglycerin 6.4 毫克。錠劑外觀，一面刻有“NC 6.4”，另一面刻有“MM”。

〈適應症〉

對狹心症之預防可能有效。

說明：作為心絞痛的預防。前述的心絞痛與有無心肌梗塞病史並無相關性。

Nitrocontin™ Continus® Tablets適用於已服用nitroglycerin舌下錠，而在症狀上有暫時性緩解的患者。這些患者可以是典型的心絞痛或是心肌梗塞後引起的心絞痛患者。

〈用法用量〉

本品必須整錠吞服，不可咬碎。劑量的調整將視患者的臨床反應及其心絞痛疼痛嚴重度而定。剛開始時，建議劑量是每日早、晚各服用2.6毫克。

一星期之後，若症狀仍未能獲得適當的控制，可將劑量提高至每日早、晚各服用6.4毫克。

已使用較輕的建議劑量，卻仍無法獲得病情改善的嚴重性心絞痛患者，可將劑量提高至每日服用三次，每次服用6.4毫克。

〈使用禁忌〉

如同所有的亞硝酸鹽類藥物，有腦出血、腦外傷及初期性青光眼的患者應禁止使用本品。

〈副作用〉

所有服用亞硝酸鹽藥物者均會出現亞硝酸鹽性頭痛(nitrate headache)，此為短暫性的現象，屬不常見的副作用。當繼續接受治療後，該症狀就會消失。儘管患者會對此症狀產生耐受性，卻不會對本品有耐受性。由於Nitrocontin™ Continus® Tablets本身的持續釋放系統的設計特色，在使用本品治療後，這種副作用實際上並未出現，或是很少發生。

〈服藥過量處理〉

排空胃內的食物。必要時，可給予氧氣。治療變性血紅蛋白貧血症(methaemoglobinaemia)，可注射甲基藍(methylene blue)。對已無意識的患者，身體要保持平躺且其頭部位置要盡量放低。醫師應明瞭，停留於小腸內的錠劑將會繼續釋出nitroglycerin並長達數小時。

〈保存期限〉

本品的貯存溫度不得高於25°C，同時避免光線照射。

〈進一步資料〉

Nitroglycerin對緩解心絞痛有雙重作用，能減輕心臟工作量與擴張冠狀動脈。因此，不僅能減少心肌對動脈氧份的需要量，且能增加攜氧血的血量輸送至心臟缺血部位。

每日服用二次劑量的Nitrocontin™ Continus® Tablets，就能從早至晚提供適當且持續的作用。當心絞痛發作的頻率與嚴重度降低後，服用nitroglycerin舌下錠的需求也實質上變少。

本品可以和beta型阻斷劑併用以加強防止心絞痛的發生。

本品的作用能預防心絞痛發作，減少對多次劑量nitroglycerin舌下錠的依賴。

〈賦形劑〉

Lactose, hydroxyethyl cellulose, cetostearyl alcohol, magnesium stearate, purified talc, erythrosine lake.

〈包裝〉

4-1000 錠塑膠瓶裝。

〈製造廠〉

Modi-Mundipharma Private Limited

Meerut-Muzaffarnagar Road, Modipuram - 250 110 U.P., India.

〈藥商〉

嘉德藥品企業股份有限公司

臺北市中山區民生東路二段176 號5 樓

TEL: 02 2507 8921 FAX: 02 2507 8886 免費服務專線：0800-033-288

TM: NITROCONTIN為商標標誌。

®: CONTINUS商標是識別MUNDIPHARMA與其關係企業所擁有的持續釋放性劑型。

本產品經由MUNDIPHARMA Medical Company, Bermuda 授權。

