消炎鎮痛劑

泰而健 錠

TIOGAM Tablets 200mg

Tiaprofenic acid Preparation

衛署藥輸字第 021454 號

Tiogam 錠為 Tiaprofenic acid 的製劑，屬於 Thiophenyl Acetic acid 系列的非類固醇性消炎鎮痛劑．本劑有和 Indomethacin 相當的強力消炎、鎮痛及解熱作用，但卻是一個對胃黏膜刺激性較弱的藥劑。

【組　成】

TIOGAM 錠：一錠中含有 Tiaprofenic acid 200mg.

賦形劑：Lactose Hydrate, Hydroxypropylcellulose, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Hypromellose, Macrogol 6000, Titanium Oxide.

【適應症】：消炎、鎮痛。

說明：

①下列疾患及症狀之消炎、鎮痛

慢性風濕性關節炎、變形性關節炎、肩關節周圍炎、頸肩腕症候群、腰痛症。

②下列疾患之解熱、鎮痛

急性上呼吸道炎（包含伴隨有急性支氣管炎之急性上呼吸道炎）。

③手術後及外傷後之消炎、鎮痛。

【用法、用量】

本藥須由醫師處方使用

①③通常成人每次服用 Tiaprofenic acid 200mg，每天口服三次。頓服的時候每次口服 200mg。惟亦得依年齡及症狀程度增減劑量。

②通常成人服用 Tiaprofenic acid 頓服時每次劑量 200mg。惟亦可依年齡及症狀程度增減劑量。但原則上一天兩次為限，一天最大劑量為 600mg。另請避免在空腹時服用本藥。

【使用上之注意事項】

1.一般注意事項

(1)由於使用消炎鎮痛劑之治療並非針對病因的療法，應留意是否可使用其他之對症療法。

(2)對慢性疾病(慢性風濕性關節炎、變形性關節炎等)使用本劑時，應考慮下列事項。

a.長期服用本藥時應進行定期臨床檢查(如尿液、血液及肝功能檢查)，如發現有檢查結果異常，應採取適當的減量或停藥措施。

b.應考慮同時使用藥物治療以外的療法。

(3)對急性疾病使用本劑時，應考慮下列事項：

a.投與時，應考慮急性炎症、疼痛、發熱的程度。

b.原則上應避免長期投與同一藥物。

c.如找得出原因，應給予對症療法。

(4)應留心觀察患者的狀況，注意是否有副作用出現。

由於偶有體溫過度下降、虛脫、四肢冰冷等現象，特別對發高燒的孩童及老年人或消耗性疾病患者，應注意觀察投與後的狀態。

(5)有時感染症狀不明顯，稍後才被確定，對因感染而起的炎症投與本藥時，應併用適當的抗菌劑，慎重投與小心觀察。

(6)應避免與其他的消炎鎮痛劑併用。

(7)應特別注意老年人及孩童的副作用，必需從最小劑量開始，小心投與。

2.下列患者請勿投與

(1)有消化性潰瘍的患者

(2)有嚴重血液異常的患者

(3)有嚴重肝障礙的患者

(4)有嚴重腎障礙的患者

(5)有嚴重心機能不全的患者

(6)對本劑成分過敏的患者

(7)乙醯水楊酸性氣喘(因非類固醇性消炎鎮痛劑誘發的氣喘發作)或有此病史的患者

(8)懷孕末期的婦女

3.下列患者請慎重投與

(1)過去曾患有消化性潰瘍的病人

(2)過去曾有血液異常病歷的患者

(3)有出血傾向的患者(因血小板功能異常而引起者)

(4)肝障礙或過去有此病歷之患者

(5)腎障礙或過去有此病歷之患者

(6)有心機能障礙之患者

(7)以前曾患過敏症之患者

(8)有支氣管氣喘的患者

(9)老年人

4.相互作用

(1)因本藥會增強下列藥物的作用，併用時應將此等藥物減量，小心投與。

Coumarin 系抗凝血劑(Warfarine 等)

鉀製劑

(2)本藥會減弱下列藥物的作用。

Thiazide 類利尿劑

(3)與鋰鹽併用時曾有使鋰鹽血中濃度上升，呈現鋰中毒的報告，併用時應注意觀察，小心投與。

(4)與 Ofloxacin 等 Quinolone 系抗菌劑併用時，曾有引起痙攣的現象，應慎重使用。

5.副作用

(1)消化器官:由於偶有消化性潰瘍、胃腸出血等情況發生，如出現此等症狀，請即刻停藥並給予適當處置。另亦偶有嘔吐、胃部不快感、腹痛、食慾不振、胃重感、胸口灼熱、下痢、口內炎、或胃炎、腹部膨滿感、便秘、舌苔、口角炎、口渴、唾液分泌亢進等現象。

(2)休克:因偶有休克現象發生，應小心觀察，如有胸悶、呼吸困難、發冷汗、血壓降低、頻脈等症狀出現，應即刻停藥並予適當處置。

(3)過敏症:因時有發疹或光線過敏症、紅斑、搔癢、氣喘發作等發生，如有此等症狀出現，應即刻停藥並予適當處置。

(4)精神神經系統:偶有思睡、眩暈、搖晃感、頭痛等現象。

(5)循環器官:偶有頻脈現象。

(6)血液:時有貧血、白血球增多、或亦有白血球減少、血小板機能低下(出血時間延長)等症狀出現之故，應注意觀察，如發現此等異常現象，應即刻停藥並給予適當處置。

(7)肝臟: 時有 GOT、GPT、Al-P 等上升現象出現之故，應注意觀察，如發現異常症狀，應即刻停藥並予以適當處置。

(8)腎臟: 時有浮腫、BUN 上升、或偶有高鉀血症、蛋白尿等症狀出現之故，應小心觀察， 如發現異常現象，需即刻停藥並予以適當處置。

(9)耳朵: 偶有耳鳴、耳道阻塞感等現象。

(10)其他: 偶有無力、倦怠感、發燒、胸痛、味覺異常、舌頭痲痺、糖尿等現象發生。

6.對老年人之投與

老年人由於容易產生副作用，應從小劑量開始慎重投與，並注意觀察患者狀況(請參考「一般注意事項」)。

7.孕婦及哺乳期婦女之使用

(1)由於有關懷孕期間使用的安全性尚未確立，孕婦及有懷孕可能性的婦女，除非經判斷其治療上的益處大於危險性，否則應避免使用本藥。

(2)在對懷孕末期的大白鼠進行之用藥試驗，發現有延遲分娩及胎兒動脈血管收縮的報告，懷孕末期的婦女請勿投與。

(3)另亦有本藥會由大白鼠乳汁分泌的報告，哺乳中的婦女應避免服用，不得不服用本藥時，請避免哺乳。

8.對孩童之投與

對孩童使用之安全性尚未確立(使用經驗非常少)

9.其他

在國外，因使用本劑引起的泌尿系統症狀(膀胱痛、排尿困難、頻尿)、血尿、膀胱炎等時有報告。

【性　狀】

{製劑的性狀} KN: 小林化工株式會社之國內會社識別代號

121: 商品識別代號(社內)

本藥為白色膜衣錠劑

{儲存方法}室溫保存，開箱後請避光保存。

{使用期限}請在外盒標示的使用期限內用完。

【包　裝】2~1000 錠盒裝

製造廠： **KOBAYASHI KAKO CO., LTD.**

Office：5-15 Yachi Awara-city Fukuiken, 919-0603 Japan.

Plant ：5-19 Yachi Awara-city Fukuiken, Japan.

藥　商： 祥全兄弟貿易有限公司

地　址： 台北市長安西路 303 號 4 樓之 2