療黴舒® 溶液 10公絲／公克 NOVARTIS

（特比那芬）

衛署藥輸字第022333號

外用抗黴菌製劑

成份

Terbinafine hydrochloride 10公絲

賦形劑：水、乙醇 (23.5% w/w) 、propylene glycol 、cetomacrogol 1000

性狀

Terbinafine 是 Allylamine 的衍生物，具有廣效抗黴菌作用。在低濃度時對皮癬菌 (Dermatophyte) 、霉 (mould) 及某些同質二形性黴菌 (Dimorphic Fungi) 具有殺黴菌作用。對酵母菌 (Yeast) 的作用，則依不同的種屬，而有殺黴菌 (Fungicidal) 或抑黴菌作用 (Fungistatic) 。Terbinafine 可干擾黴菌生合成麥角硬脂醇 (Ergosterol) 的先期步驟，導致麥角硬脂醇不足，且因細胞內積聚過多的 Squalene 引起黴菌死亡。

Terbinafine的作用機轉是抑制黴菌細胞膜上的Squalene epoxidase，此酵素的作用與細胞色素P450系統 (Cytochrome P450 system) 無關，且Terbinafine並不會影響荷爾蒙或其他藥物的代對。

藥物動力學

外用僅低於5%的劑量被吸收，全身性的吸收非常輕微。

適應症

治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

用法用量

醫師藥師藥劑生指示藥品

成人：療黴舒溶液可依適應症一天使用1至2次，在使用療黴舒溶液前須將患部清理乾淨和乾燥，將療黴舒溶液適量潤濕於患部及其周圍。

一般治療期間

體癬、股癬	一天一次／1週
足癬	一天一次／1週
花斑癬	一天二次／1週

通常在使用療黴舒溶液數日後會有症狀減輕的現象，不規律或提早停止使用療黴舒溶液會造成再復發現象，在治療1週後如沒有明顯的改善，需重新評估其診斷。

老年人：尚無證據建議老年人的劑量需與年輕人不同或有不同的副作用。

兒童：兒童使用療黴舒溶液的經驗很少。

禁忌

對Terbinafine或其賦形劑過敏者。

注意

因療黴舒溶液含乙醇，身上有傷口的患者應小心可能會引起刺激。

療黴舒溶液僅限於外用，因可能會刺激眼睛，故不可用於臉部，當意外接觸眼睛時，以清水沖洗眼部，若有發生任何不適症狀應找醫師協助。

療黴舒溶液應置於孩童不能取得之處。

懷孕與授乳

動物研究顯示Terbinafine並無致畸胎性，到目前爲止並無因使用療黴舒



而產生畸形的報告。但因臨床上對孕婦的用藥經驗有限，因此療徽舒能僅用於孕婦有明確適應症。Terbinafine 會分泌於乳汁中，使用療徽舒溶液的少量皮膚吸收不會影響嬰孩。

交互作用

尚未有療徽舒溶液與其他藥物有交互作用。

副作用

紅腫、擦癢或刺痛偶爾會發生於使用部位，但使用療徽舒溶液不必爲此而停藥。這些無害的症狀須與過敏反應有所區別，過敏症狀很少發生，但需停止使用療徽舒。

過量

目前尚無使用療徽舒過量之報告，萬一誤食療徽舒溶液時，其副作用會如療徽舒錠劑過量時所產生之副作用（如：頭痛、噁心、上腹疼痛及暈眩）。溶液中所含的23.5%乙醇也需考慮留意。

其它注意事項

架儲期

本藥應於外盒標示之有效期限內使用。

儲存

請參考外盒

製造廠：Novartis Pharma SAS
廠　址：26rue de la Chapelle B.P.349,68330 Huningue, France
藥　商：台灣諾華股份有限公司
地　址：台北市仁愛路二段99號11樓
電　話：(02)2341-6580
NOV.2005

19451241.8906

而產生畸形的報告。但因臨床上對孕婦的用藥經驗有限，因此療徽舒能僅用於孕婦有明確適應症。Terbinafine 會分泌於乳汁中，使用療徽舒溶液的少量皮膚吸收不會影響嬰孩。

交互作用

尚未有療徽舒溶液與其他藥物有交互作用。

副作用

紅腫、搔癢或刺痛偶爾會發生於使用部位，但使用療徽舒溶液不必爲此而停藥。這些無害的症狀須與過敏反應有所區別，過敏症狀很少發生，但需停止使用療徽舒。

過量

目前尚無使用療徽舒過量之報告，萬一誤食療徽舒溶液時，其副作用會如療徽舒錠劑過量時所產生之副作用（如：頭痛、噁心、上腹疼痛及暈眩）。溶液中所含的23.5%乙醇也需考慮留意。

其它注意事項

架儲期

本藥應於外盒標示之有效期限內使用。

儲存

請參考外盒

製造廠：Novartis Pharma SAS
廠　址：26rue de la Chapelle B.P.349,68330 Huningue, France
藥　商：台灣諾華股份有限公司
地　址：台北市仁愛路二段99號11樓
電　話：(02)2341-6580
NOV.2005

19451241.8906