近畿胃腸藥顆粒

NEW ICHOYAKU KINKI

衛署藥輸字第 023377 號

本劑為中和過多胃酸之制酸劑，配合消化酵素及有芳香舒暢氣味的胃腸藥，具有緩解胃痛、胸灼熱感、胃消化不良的胃腸不舒服等症狀，同時並有促進消化作用

【組成·性狀】

本劑含有下成份有清涼味之淡灰褐色之細粒狀顆粒劑。

成　　份	1 克中含量(每包 0.9g)	作　　用
Biodiastase-G	111mg	**主要幫助澱粉消化、促進吸收**
Sodium Bicarbonate Precipitated Calcium Carbonate	555mg 222mg	**中和胃酸、改善胃痛、胸灼熱感之症狀。**
Powdered Fennel	44.4mg	
Crude Glycyrrhiza Extract Sodium Copper Chlorophyllin L-Menthol Cinnamon Oil Lactose Hydroxypropyl Cellulose	33.3mg 6.66mg 4.07mg 0.36mg	

【效能·效果】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，幫助消化。

【用法、用量】

15 歲以上……1 次 1 包
11 歲以上未滿 15 歲……1 次 2/3 包
8 歲以上未滿 11 歲……1 次 1/2 包
6 歲以上未滿 8 歲……1 次 1/3 包
3 歲以上未滿 6 歲……1 次 1/4 包
一日 3 次飯後服用
3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

※　醫師、藥師、藥劑生指示藥品

【包裝】0.9g／鋁箔袋，6~111 袋紙盒裝

製造廠：近畿醫藥品製造株式會社
KINKI IYAKUHIN SEIZO CO., LTD.
714 SHIMIZUDANI TAKATORI-CHO
TAKAICHI-GUN NARA-KEN JAPAN

藥商：德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段 3 號 2 樓

【注意事項】

1) 應放置於小孩伸手不及之處。
2) 避免陽光直射，儘可能存於 25℃以下陰涼之處。
3) 避免誤食，為保持品質之故，請勿放入其它容器內。
4) 1 包分次服用時，請將裝口折疊保存，2 日以內服用完畢。
5) 除非醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
6) 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【警語】制酸劑：

1)本製劑含鈣之制酸劑可能引起便秘或腹瀉，長期服可能有高血鈣、腎哀竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
2)本製劑含碳酸氫鹽之制酸劑可能引起腹脹、打嗝。
3)本製劑含碳酸氫納會引起腹脹、打嗝。如長期與鈣質牛奶併用會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
4)本藥每日最大建議劑量之含納量超過 5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
5)除非有藥師、藥劑生或醫師指示，一天內不可服用超過每日最大劑量之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。
6)除非有藥師、藥劑生或醫師指示，未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
7)單次劑量之酸中和能力為 9.833mEq，單次劑量之納含量為 5.95mEq。
8)如有慢性胃病、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用制酸劑。
9)消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
10)除非有藥師、藥劑生或醫師指示，制酸劑不得併用其他藥品。

消化酵素：

有些病人可能對酵素過敏。