近畿拿走痛顆粒

醫師藥師藥劑生指示藥品

NOHAREGEN Granule

衛署藥輸字第 023535 號

【成分】每包(0.9g)含有

有效成分及含量：

Acetaminophen	**300 mg**
Ethenzamide	**260 mg**
Anhydrous Caffeine	**80 mg**

其他成分(賦形劑)：Sodium Copper Chlorophyllin、Gelatin、Lactose Hydrate、Corn Starch。

【用途(適應症)】

退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(二) 有蠶豆症的人。

(三) 懷孕 28 週以上的婦女。

(四) 18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 成人連續使用本藥超過 7 天，症狀未緩解的人。

(二) 有消化性潰瘍或使用抗凝血劑的人。

(三) 有肝臟疾病的人。

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 曾有消化性潰瘍的人。

(三) 同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、 其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議劑量。

(四) 服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。

(五) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。

(六) 避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量
18 歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每 4~6 小時可重複使用，每次 1 包。每 24 小時內不可超過 3 次。飯後半小時內服用為宜。
未滿 18 歲	請勿使用。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹 · 發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、胃腸出血
精神神經系統	頭暈、耳鳴
其他	出血傾向、氣喘

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 使用本藥 3 天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。

(三) 服用過量[每日超過 4,000 毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(四) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】2 - 1111 包鋁箔袋盒裝(每包 0.9 公克)。　【儲存條件】25℃以下。

【製造廠】近畿醫藥品製造株式會社

KINKI IYAKUHIN SEIZO CO., LTD.

714 SHIMIZUDANI TAKATORI-CHO TAKAICHI-GUN NARA-KEN JAPAN

【藥商】優德貿易有限公司

台北市八德路三段 12 巷 51 弄 24 號 1 樓

【總經銷】麗磐有限公司

台北市八德路二段 447-1 號 3 樓