販売元大正製薬有限公司
台北市四平街18號2樓

003

1カプセル中

微小循環系賦活剂

トコエヌ®200ソフトカプセル

1カプセル中 トコフェロールニコチン酸エステル200mg含有

含　量	200mg
容　量	1000カプセル
包　装	PTP
貯　法	しゃ光した気密容器 25℃・60%RH

効能・効果、用法・用量、
使用上の注意については、
添付文書をよくご覧ください。

1000caps.

SOFT CAPSULE

トカプセル
テル200mg含有
効果、用法・用量、
の注意については、
書をよくご覧ください。

1000カプセル

微小循環系賦活剤

トコエヌ®200ソフトカプセル

1カプセル中 トコフェロールニコチン酸エステル200mg含有


大正貿易有限公司

品名	妥克脂軟膠囊 TOCO N 200 Soft Cap.
主成份含量	Tocopherol Nicotinate 200 mg
製造廠 地址	TOKAI CAPSULE CO., LTD. 168 Kuzawa Fuji-Shi Shizuoka-Ken,Japan
藥商 地址	大正貿易有限公司 台北市四平街18號2樓
許可證字號	衛署藥輸字第023604號
類別	本藥須由醫師處方使用
製造批號	見外盒側面
有效期限	五年

請詳閱說明書

仿單標籤粘貼表

產品名稱	妥克脂軟膠囊	申請廠商	大正貿易有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥輸字第 023604 號		



※ 外文仿單應檢附中文譯文

仿單標籤粘貼表

產品名稱	妥克脂軟膠囊	申請廠商	大正貿易有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥輸字第 023604 號		

妥克脂 軟膠囊

微小循環系賦活劑
TOCO N 200 Soft Cap
Tocopherol Nicotinate製劑

衛署藥輸字第023604號
健保代碼 B023604100
本藥須由醫師處方使用

【品　　名】TOCO N 200軟膠囊
【主 成 分】Tocopherol Nicotinate
【每粒含量】200mg
【賦 形 劑】Glycerol Esters of Fatty Acids, Gelatin, Concentrated Glycerin, Ethyl Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Titanium Oxide, Officially Designated Coal-Tar Color, Attachment 1, Polysorbate 80

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用、未滿15歲的小孩、曾經對本藥引起過敏症狀的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  (1)接受醫師診治中者　(2)曾因藥物引起過敏者
- 其他使用上注意事項
  (1)副作用　本劑對使用結果調查等副作用之發現頻率之明確度調查尚未實施。

	頻　率　不　明
消化系統	食慾不振、胃部不適、胃痛、噁心、下痢、便秘
過敏症 註	發疹
其他	臉紅

註：有出現此症狀時採取終止服用等適當措施。

(2)使用上注意事項
取用PTP包裝藥劑時應指導取出後服用(由於曾有誤服PTP片其硬尖角部刺入食道黏膜，引起穿孔併發縱隔洞炎等嚴重合併症之報告)。

【警語】


- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

相關部位	症狀
皮膚	起疹子、紅腫、發癢
消化器官	胃部不舒服

- 服用後可能會出現上述症狀，若症狀持續或惡化時，請停止服用，並持本說明書，向醫師、藥劑師或登記銷售之業者諮詢。
- 服用1個月若症狀無改善時，請停止使用，並持本說明書，向醫師、藥劑師或登記銷售之業者諮詢。
- 服用後，可能造成生理期提早，或經血量增加之情形。若持續長時間出血時，請持本說明書，向醫師、藥劑師或登記銷售之業者諮詢。

【性　　狀】淡黃橙色不透明軟膠囊　【劑　　型】軟膠囊
【內 容 物】淡黃色~橙黃色之黏稠液或淡黃色~白色半固體
【外　　型】⬭　【長　　徑】12.8mm
【短　　徑】7.5mm　【平均重量】435mg
【適 應 症】
末稍血管循環障礙
【用法、用量】
通常成人每日3顆分3次投與或每日Tocopherol Nicotinate300~600mg
又可依症狀、年齡做適宜增減。
【識別號碼】MWT-307　【使用期限】標 示 於 外 盒

融溫點：約38℃
構造式：



製造廠名：東海膠囊株式會社
TOKAI CAPSULE CO.,LTD
製造廠商：168Kuzawa Fuji-Shi
Shizuoka-Ken, Japan
藥　　商：大正貿易有限公司
藥商地址：台北市中山區四平街18號2樓

※ 外文仿單應檢附中文

限公司


【藥物動態】

〈血中濃度〉

健康男子12名口服本劑2粒(100mg)，測定血漿中Tocopherol Nicotinate(原型未變化體)之濃度。

服用5小時，血中濃度達到最高Cmax=1.245μg/ml然後逐漸減少，又血中濃度曲線下面積(AUC)為5.137μg.hr/ml

Tocopherol Nicotinate血中濃度時間變化(n=12)



性狀：黃色～橙黃色液體或固體，易溶於乙醇殆不溶於水，乙醇溶液無旋光性遇光起變化。

【包裝】 1.000Capsules(PTP)，100Capsules(PTP)

【儲存方法】 25℃，60%RH

【藥效、藥理】

1、直接作用於血管平滑肌，顯示微小循環系持續性血流之增加。

2、使細胞膜構造安定化的同時改善毛細血管之脆弱化。

3、改善脂質代謝，降低血中膽固醇、中性脂肪等。

【有關有效成分之理化學資料】

一般名：Tocopherol Nicotinate


化學名：dl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,5,7,8-tetramethyl-6-Chromanyl nicotinate

分子式：$C_{35}H_{53}NO_3$

分子量：538.81

融溫點：約38℃

構造式：



製造廠名：東海膠囊株式會社
TOKAI CAPSULE CO.,LTD

製造廠商：168Kuzawa Fuji-Shi
Shizuoka-Ken, Japan


藥　商：大正貿易有限公司

藥商地址：台北市中山區四平街18號2樓

※ 外文仿單應檢附中

仿單標籤粘貼表

產品名稱	妥克脂軟膠囊	申請廠商	大正貿易有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥輸字第 023604 號		





※ 外文仿單應檢附中文譯文