

美樂芬止痛片
Snedifen 400mg Film Tablet

號45554 編第字輸粟署衛

之後 14 天內忌用本品。
3. 最近發生心肌梗塞的病人：
觀察性研究顯示，在心肌梗塞後使用 NSAIDs 藥品，在用藥第一週時，出現嚴重的
梗塞，心臟血管相關死亡及整體死亡率增加。
NSAIDs 者，有等於 20%~100% 的死亡率。

1. NSAIDs 藥品會增加發生嚴重心肌梗塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能延長藥品的作用時間。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且隨時間越長，風險越大。

主要成分：Ibuprofen as L-Arginine salt 770 mg(equal to ibuprofen 400 mg)
赋形剂：L-arginine, Sodium hydrogen carbonate, Crospovidone, Magnesium stearate, Hypromellose
(Methocel 5CP), Sucrose, Titanium dioxide, Macrogol 4000, Purified water.

產品治癒性人類引上神退炎 / 抗風濕，非類固醇類。
適應症：平喘、消炎、鎮痛。

禁忌：1. 對 ibuprofen 過敏之患者。
2. 活化性潰瘍、出血或等孔病史者；具 NSAIDs 相關腸胃道出血或穿孔病史者；具
消化性潰瘍發作之既往史者。

3. 假冒出血傾向之患者。
4. 假冒肝衰竭。
5. 服用 aspirin 或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、荨麻疹或其他過敏反應者。此等病人曾有嚴重(極少數為致死性)類固醇反應。

• 心臟搭橋手術 (Coronary artery bypass graft, CABG) 之後 14 天內禁用。

主畜事項
患感冒者，需由醫生指導下使用本品。
藥物相互作用
抗血凝劑有相互作用，上述抗血凝劑使用者，請向醫生查詢妥當後，方
可服用本品。

仿單標籤粘貼表

產品名稱	美樂芬止痛片 Spedifen 400mg Film Tablets	申請廠商	幸生實業股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署核可證明	衛署藥輸字第 024554 號		

作用：偶有皮膚過敏反應（紅斑、荨麻疹、腹瀉）。服用布洛芬最常見之副作用是腸胃不適，罕有腎小管鈣化。

出若有其他上述未有列出之副作用發生，應延醫治療。
田生田晉

成年及十二歲以上的兒童：
成年人及十二歲以上的兒童：
成年人及十二歲以上的兒童：
成年人及十二歲以上的兒童：

本品之有效期為參照本品之原裝產品及妥善貯存。
包裝袋上有效期，切勿使用過期藥物。

將藥品置於小孩不易擷取之處。

Zambon
Zambon S.p.A.
Vicenza (Italy)
Zambon S.p.A.
Vicenza (Italy)
製造廠：Zambon S.p.A.
Plant : Via Della Chimica 9, 36100 Vicenza, Italy
Office : Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milan, Italy
營業商：幸生實業股份有限公司
地址：臺北市中山區臨江路 520 號 6 樓
電話：(02) 2536-9338



Zambon S.P.A.
Vicenza (Italia)

製造廠 : Zambon S.P.A.
 Plant : Via Della Chimica
 Office : Via Lillo del Duca
 董事會 : 幸生實業股份有限公司
 藥地電話 : 臺北市中山區松平街 9-1 號 (02) 2596-9138