

副作用：

在臨床研究中，並無與 **Tobrex 2x** 眼藥水有關的眼部或全身性副作用報告。最常見的眼部副作用為眼部出現包括眼部搔癢在內的過敏反應症狀、眼部充血及流淚。這些問題的發生率各為 1.5 %。其他發生率低於百分之一的副作用有：眼部過敏反應、眼部分泌物、眼部不適、結膜水腫、眼瞼水腫、眼瞼紅疹及眼瞼疾病。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用

將一滴 **Tobrex 2x** 眼藥水點入結膜囊，每天兩次（早上及傍晚），連續點藥一週。病情嚴重時：第一天於清醒時點藥 4 次，接著每天於清醒時點藥 2 次，每次各一滴，直到完成整個療程。**Tobrex 2x** 眼藥水可使用於小兒患者（1 歲以上幼兒），劑量與成人相同。

用於肝及腎功能不全者：

經眼投予 **tobramycin** 進入全身循環的量極低。同時接受全身性 **aminoglycoside** 類抗生素治療的患者，需小心監測血中藥物總濃度，以確保維持適當的治療藥物濃度。

使用點眼液建議事項—為了正確使用點眼液，請依下列步驟指示：

1. 洗淨雙手，可能的話請站立於鏡子前。
2. 轉開瓶蓋，小心避免讓滴頭尖端碰觸到任何表面，因為這可能會使瓶內藥品受到污染。
3. 以單手將藥瓶倒置。
4. 另一隻手將患眼的下眼瞼往外翻，頭往後傾，同時眼睛往上看。
5. 將滴頭尖端靠近眼睛，但不可接觸到，輕輕擠壓瓶身，將點眼液滴至眼睛與眼瞼間的位置。
6. 鬆開下眼瞼，並眨眼數次，以確保藥液覆滿整個眼睛表面。
7. 如有需要，重複步驟 4、5 及 6，施藥於另一眼。
8. 使用後將藥瓶旋緊。

包裝：100 公撮以下塑膠瓶裝。

開封後一個月請丟棄。

貯存：貯存於 30°C 以下。

所有藥品請置於兒童無法取得處。

Alcon
TAIWAN

製造廠：Alcon Cusi, S.A.

廠址：Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain

藥商：瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北縣新店市寶中路 119 號 4 樓

電話：(02)2917-2468