

康斯丁糖衣錠

NEAC EXP S.C. Tablets

衛署藥輸字第 025010 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

- 維生素 B1、B6、B12 可以促進食物中養分代謝，作用於神經系統，改善疲勞狀症狀。
- 維生素 E 促進末梢血液循環，有改善手腳麻痺及肩膀僵硬的效果。
- CALCIUM PANTOTHENATE 可協助促進食物中養分的代謝。

【成分】

有效成分	含量
FURSULTIAMINE HYDROCHLORIDE (=FURSULTIAMINE) (維生素 B1 衍生物)	36.39mg (33.33mg)
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (維生素 B6)	33.33mg
CYANOCOBALAMIN (維生素 B12)	500 μg
TOCOPHEROL CALCIUM SUCCINATE (=TOCOPHEROL SUCCINATE) (維生素 E)	34.53mg (33.33mg)
CALCIUM PANTOTHENATE (泛酸鈣)	10mg
GAMMA - ORYZANOL (穀維素)	3.33mg

其他成分(賦形劑)：

Calcium Lactate Hydrate, Light Anhydrous Silicic Acid, Hydroxypropylcellulose, Cellacelate, Microcrystalline Cellulose, Potato Starch, Lactose Hydrate, Low Substituted Hydroxypropylcellulose, Magnesium Stearate, Hypromellose, White Soft Sugar, Powdered Acacia, Polyoxyethylene Polypropylene Glycol, Talc, Titanium Dioxide, Riboflavin Phosphate Sodium, Carnauba Wax

【用途(適應症)】

維生素 B1、B5 (泛酸鈣)、B6、B12 及維生素 E 缺乏症

【使用上注意事項】

- 一、 有下列情形者，請勿使用：對本藥成分過敏的人。
- 二、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 1)正在接受醫師治療的人。
 - 2)曾經有因為藥物而引發過敏症狀的人。
- 三、 其他使用上注意事項：
 - 1)避免陽光直射。
 - 2)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 3)為避免誤用及變質，請勿改裝於其他容器中。

4)玻璃瓶中的填充物是運送中避免本藥品破損用的，請於開封後丟棄填充物。(由於本藥品為糖衣錠，有可能因為掉落的衝擊而導致錠劑的破損，請小心拿取)

5)玻璃瓶中使用包裝紙包起來的平型錠為乾燥劑，請勿服用。

6)每次服用後請將玻璃瓶蓋旋緊。(濕氣可能導致變質)

7)若手是濕的，則請勿碰觸本藥。本藥若接觸到水，表面的一部分有可能會溶解並產生變色。另外，被弄濕的錠劑若放回玻璃瓶中有可能會影響其他的錠劑，所以被弄濕的錠劑請勿放回玻璃瓶中。

8)超過保存期限之藥品請勿服用。

9)請於外盒上的「開封年月日」紀錄欄中寫下玻璃瓶蓋的開封日期。

10)另外，就算是保存期限內，只要開封了請於開封後 6 個月以內服用完畢。

【警語】

一、 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	起疹、發紅、搔癢
消化器官	噁心、嘔吐、口腔發炎、食慾不振、軟便、下痢、便秘

二、 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1)生理期提早、經血量變多，或出血持續很長一段時間。
- 2)服用一個月後，症狀仍未改善。

【用法用量】請嚴謹遵守用法用量

年齡	1 次量	1 天服用次數
15 歲以上	2~3 錠	1 次
11 歲以上未滿 15 歲	1 錠	1 次，請在監護人的監督下服用
未滿 11 歲		請勿使用

【包裝】6~1000 錠玻璃瓶裝

【儲存】保存於 25℃ 以下

經銷商：天良生物科技企業有限公司 新北市汐止區大同路一段 147 號 9 樓

藥商：優德貿易有限公司 台北市八德路三段 12 巷 51 弄 24 號 1 樓

製造廠：NEIYAKU KAGAKU CO., LTD

2-25 ASAHIMINAMI-CHO YAMATOTAKADA-SHI NARA-KEN JAPAN