“鐵甲”寒舒感冒軟膠囊

許可證字號:衛署藥輸字第 025265 號

COLDMIN CAPSULES

醫師藥師藥劑生指示藥品

【主成分】

膠囊中含有下列成分：

Acetaminophen 150mg

Chlorpheniramine Maleate 1.25mg

dl-Methylephedrine Hydrochloride 10mg

Anhydrous Caffeine 8.33mg

【賦形劑】

Polysorbate 80

Glycerol Esters of Fatty acids

Light Anhydrous Silicic Acid

Medium Chain Fatty Acid Triglyceride

Gelatin

Concentrated Glycerin

Titanium Oxide

【特性】

COLDMIN CAPSULES 爲綜合感冒劑，不含阿斯匹靈，不刺激胃、有效緩解感冒的各種症狀。

【藥理作用】

1. Acetaminophen：解熱鎮痛、對胃不刺激、可緩解頭痛、鼻竇疼痛。
2. Chlorpheniramine Maleate：可緩解上呼吸道過敏症狀、如打噴嚏、鼻塞等。
3. dl-Methylephedrine Hydrochloride：可使支氣管擴張。

【儲存上注意】

1. 本劑係採用軟膠囊、請避免陽光直射本品、宜放置於溼氣少、陰涼處(25℃以下)。
2. 爲防止兒童誤食、請放置於兒童伸手不及之處、妥善保存。

【包裝】

12-1,000 粒 PTP 鋁箔盒裝。

【用法用量】

一日 3 次。成人每次 2 粒，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1 粒。

【適應症】

緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛）

【注意事項】

1. 爲防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：

（一）孕婦及授乳婦不建議自行使用。

（二）服用本藥時不得併服其他藥品。

4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、喉嚨疼痛、頭暈、耳鳴、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應立即停藥就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

（一）6 歲以下不建議自行使用。

（二）曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。

3. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有發燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
4. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
5. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
6. 不要服用本藥超過七日。
7. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還並隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
8. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
9. 含 Acetaminophen 之本類製劑，增列下數警語：

酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥。因爲 Acetaminophen 可能造成肝損害。

10. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

（一）服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。

（二）除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

1. 本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
2. 本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

藥商：中榮貿易股份有限公司　　新北市三重區福隆路 5 號 2 樓
製造廠：Tokai Capsule Co .,Ltd.　168,Kuzawa, Fuji-city, Shizuoka-pref., Japan