易錠好®發泡錠　　醫師藥師藥劑生指示藥品

PARTAMOL® Effervescent Tablets 500mg (Acetaminophen)　衛署藥輸字第 025525 號

【成分】

有效成分及含量：錠含有：Paracetamol (Acetaminophen) 500mg

其他成分(賦形劑): Anhydrous citric acid, Anhydrous sodium bicarbonate, Anhydrous sodium carbonate, Sodium benzoate, PEG 6000, Saccharin sodium, Povidone K30, Aspartame, Lemon flavour powder, Ethanol.

【用途(適應症)】

解熱、鎮痛。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用: （一）曾因本藥成分引起過敏的人。（二）本品含阿斯巴甜賦形劑，苯酮尿症病人不宜使用。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：（一） 3 歲以下。 （二）成人連續服用本藥超過 7 天， 12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未 緩解的人。（三）正服用 metoclopramide 或 domperidone 用以治療頭暈及嘔吐的人。（四）正服用 cholestyramine 用以治療高膽固醇的人。（五）正服用抗凝血劑(如 wafarin)且須每天服用止痛劑持續一段時間的人。（六）有肝臟疾病的人。（七）嚴重腎臟疾病病人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

（二）同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項:

（一）為防止兒童誤食請妥善保管。（二）避免陽光直射。（三）勿超過建議使用量。（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。（五）本藥每錠含 412.5 毫克之鈉。若正進行低鈉飲食的人，需特別注意。（六）酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】將藥錠置於杯中，倒入半杯溫開水，待藥錠發泡溶解完畢後飲用

成人及 12 歲以上	發燒或需要時服(使)用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服(使)用，每次1~2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2 。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4 。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	**副作用**
皮膚	**發疹、發紅**
消化器官	**噁心、嘔吐、食慾不振**
神經系統	**頭暈、耳鳴**
其他	**喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊**

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

（一）若有任何不適情況產生。

（二）服用本藥 3 天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

（三）服用過量[每日超過 4,000 毫克(mg)，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】2-1000 錠鋁箔盒裝。

【儲存】30℃以下，密封且避光之陰涼處存放。

藥商:韋淳貿易股份有限公司 地址:台北市松江路 65 號 4 樓 電話:02-2500-6378

製造廠: STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD. 廠址: No.40 Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An District, Binh Duong Province,VietNam

包裝廠:昱昇藥業有限公司桃園廠 廠址:桃園縣蘆竹鄉南山路一段 436 號