熱 龍 止 痛 藥 錠
NEW PITARIWAN TABLETS

衛署藥輸字第 025555 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

熱龍止痛藥錠是加入了可以緩解發燒、頭痛、關節疼痛的 Acetaminophen、Ethenzamide、還有可以增加其效果的 Allylisopropylacetylurea，並配合可以幫助 Acetaminophen 緩解頭痛的 Anhydrous Caffeine 所製成的。熱龍止痛藥錠是一種可以緩解疼痛的非匹林系的解熱鎮痛錠。

【成分】一日量 (6 錠)中：

有效成分	含量	說明
Acetaminophen	**900mg**	**具解熱、鎮痛的效果**
Ethenzamide	**800mg**	**具消炎、解熱、鎮痛的效果**
Allylisopropylacetylurea	**150mg**	**鎮靜，與其他解熱鎮痛劑配合可增加鎮痛效果**
Anhydrous Caffeine	**180mg**	**增加 Acetaminophen 緩解頭痛之效果**

其他成分(賦形劑)：Microcrystalline Cellulose、Light Anhydrous Silicic Acid、Magnesium Stearate、Hydroxypropylcellulose、Croscarmellose Sodium

【用途（適應症）】
解熱，鎮痛(頭痛、牙痛、月經痛、關節痛、神經痛、肌肉痛之緩解)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. **曾因本藥成分引起過敏的人**
2. **有蠶豆症的人**
3. **懷孕 28 周以上的婦女**
4. **18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群**
5. **曾因服用本藥或其他綜合感冒藥、解熱鎮痛藥後，引發氣喘的人**

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. **18 歲以下**
2. **成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人**
3. **有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人**
4. **曾診斷為下列疾病的人：心臟病、腎臟病、胃及十二指腸潰瘍**
5. **有肝臟疾病的人**

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. **孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦**
2. **曾有消化性潰瘍的人**
3. **正在服用其他解熱鎮痛、綜合感冒、鎮靜、鎮暈等藥品**
4. **同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品**
5. **65 歲以上的人**

四、其他使用上注意事項：

1. **為防止兒童誤食請妥善保管**
2. **避免陽光直射**
3. **勿超過建議使用量**
4. **服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害[相當於本品 27 錠]**
5. **酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險**
6. **避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用**
7. **可能會引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械**
8. **未經醫師處方或指示，不得長期服用**

【用法用量】

年齡	使用劑量	服用次數
成人及 18 歲以上	1 次 2 錠	1 日 3 次，飯後 30 分鐘內服用，服用間隔為 4 小時以上
未滿 18 歲	請洽醫師診治，不宜自行服用	

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、史蒂芬-強生症候群(Stevens-Johnson syndrome(幾乎很少))、毒性表皮溶解症(Toxic epidermal necrolysis(幾乎很少))
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	出血傾向、氣喘、體溫過低

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. **若有任何不適情況發生**
2. **服用本藥 3 天後，發燒、疼痛症狀未見改善**
3. **服用過量[每日超過 4,000 毫克(mg)的 Acetaminophen(相當於本藥 27 錠)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等**
4. **有過敏情形，例如臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐**

【包裝】 12-1000 錠 PTP 鋁箔盒裝、玻璃瓶裝

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】 25℃以下儲存

製造商：SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.
220-1 CHIHARA OAZA GOSE-CITY
NARA JAPAN

藥商：德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段 3 號 2 樓