size：100×195mm

衛署藥輸字第 025668 號

# 睛亮點眼液
## Eyes Clean Eye Lotion

【特點】
1. 含有六種有效成分。
2. Panthenol，Neostigmine Methylsulfate可緩和眼睛疲勞、眼睛不適等症狀。
3. ε-Aminocaproic Acid，Chlorpheniramine Maleate，Naphazoline Hydrochloride 的有效成分可緩解眼睛紅、癢。

【成分】Each 100mL Contains :

有效成分及含量：Naphazoline Hydrochloride..... 3 mg
Neostigmine Methylsulfate..... 5 mg
ε- Aminocaproic Acid..... 1000 mg
Chlorpheniramine Maleate ..... 30 mg
Panthenol ..... 100 mg
Taurine ( Aminoethylsulfonic Acid ) ..... 500 mg

其他成分（賦形劑）：Citric Acid Hydrate, l-Menthol, dl-Camphor, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor oil 60, Propylene Glycol, Benzalkonium Chloride Concentrated Solution 50, Chlorobutanol.

【用途(適應症)】暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適或眼睛紅、眼睛疲勞、眼睛癢。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：青光眼的人
四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管
（二）避免陽光直射
（三）使用前，請洗淨雙手
（四）請依照藥品標示使用
（五）以下情形，請勿繼續使用：
（1）超過保存期限的眼藥水
（2）開瓶 28 天後
（3）藥液混濁、變色或出現異物時
（六）為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝
（七）如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
（1）使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用眼藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏
（2）使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上
（八）配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
（九）過度使用會增加眼睛紅腫
（十）保存時，如有成分形成白色結晶，附著於點眼口周圍或瓶蓋內側，請用乾淨的紗布清潔後再使用。

【用法用量】

| 一天 3 至 4 次 | 每次 1 至 2 滴 |
|---|---|

【警語】
服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）連續使用三天症狀沒有改善
（二）使用後產生眼睛劇痛，持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感
（三）若有任何不適情況產生

【包裝】100 毫升(mL)以下塑膠瓶裝。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲存條件】請儲存於溫度 25℃ 以下。
【諮詢專線】02-26981567

製造廠：Teika pharmaceutical Co. Ltd. 3-27, Arakawa 1-chome, Toyama-shi, Toyama, Japan
藥　商：一成藥品股份有限公司 新北市汐止區新台五路一段77號 19 樓之 8