105mm

148mm

【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
精神、神經系統	思睡、頭暈、心智混亂
腸胃	胃腸不適

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
   (1)有高燒、出疹（過敏）、噁心、嘔吐、持續性頭痛及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象。
   (2)當出現藥物過量可能引起的症狀如思睡、興奮以及呼吸困難時。

【包裝】24粒鋁箔盒裝。
【貯存方法】置於30°C以下室溫貯藏，避免陽光直射及潮濕之處。
【諮詢專線】(02) 2768-0669
【藥商】香港商香港利潔時有限公司臺灣分公司
【地址】臺北市大安區仁愛路三段136號六樓
【製造廠】Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road,
Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand
【有效期間】二年。
衛署藥輸字第025743號

8249237

舒立效 咳消配方 口含錠
Strepsils® DRY COUGH LOZENGES

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【性狀】本品為淡橘色，呈圓形之口含錠。
【成分】
有效成分及含量 ：每錠含Dextromethorphan Hydrobromide 5.0mg
其他成分(賦形劑)：Menthol (as levomenthol), Eucalyptus Oil, Star Anise Oil, Peppermint Oil, Clove Oil, Cassia Oil, Strong Capsicum Tincture 1+7, Saccharin Sodium, Sucrose, Liquid Glucose, Sunset Yellow FC Edicol, Ponceau 4R Edicol, Purified Water
【作用】Dextromethorphan是一種鎮咳劑，它具有減緩與抑制咳嗽的效果。
【用途(適應症)】鎮咳。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用
   曾經因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
   (1)未滿6歲之孩童。
   (2)有肝、腎疾病的人。
   (3)吸煙、氣喘、慢性阻塞性肺疾（如慢性氣管炎、肺氣腫）所引起咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
   (4)服用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
   孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
4. 其他使用上注意事項
   一、為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
   二、避免陽光直射。
   三、請勿超過建議劑量及連續使用超過5天。
   四、本藥不得與含酒精飲料併服。
   五、本品因嗜睡作用，可能影響開車或操縱機械的能力。

【用法用量】

13歲以上	視需要，每4小時口含二粒，先含一粒慢慢溶化後再含另一粒。每日最多劑量為24錠。
6-12歲	視需要，每4小時口含一粒，使其於口中慢慢溶化。每日最多劑量為12錠。