

消化不良・胃酸過多治療劑

愛胃康顆粒

HIWEIKAN GRANULES

【成分】有效成分及含量，每1.2公克中含有：

Sodium Bicarbonate.....740mg **Gentian**.....13mg
Glycyrrhiza.....100mg **Rhubarb**.....13mg
Magnesium Carbonate(Heavy).....80mg

其他成分(賦形劑)

Silicon Dioxide(light)、Magnesium Aluminum Meta-Silicate、Corn Starch (Dry)、Povidone、Methylcellulose、Cinnamon Powder、Carboxymethylcellulose Calcium、Clove Oil、Cinnamon Bark Flavor T4666S、l-Menthol、Ethanol

【用途(適應症)】消化不良、胃酸過多、食慾不振、腹部膨滿、胃痛、健胃整腸。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 1.3歲以下。
 - 2.消化道潰瘍的人。
 - 3.須限鹽飲食的人。
 - 4.有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
 - 5.腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 2.與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項：
 - 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 2.避免陽光直射。
 - 3.勿超過建議使用量。
 - 4.一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上
 - 5.如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
 - 6.腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水
 - 7.可能引起腹脹、打嗝。

【用法用量】

成人	每次1匙(約1.2克)	每日3次，以開水送服(附量匙)
7歲以上15歲以下	每次1/2匙	
4歲以上7歲以下	每次1/3匙	
2歲以上4歲以下	每次1/6匙	

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - 1.若有任何不適情況產生。
 - 2.連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】7.2-500公克AL-AL鋁箔盒裝、玻璃瓶裝

【類別】成藥



美西製藥有限公司
 高雄市仁武區仁武里工業一路九號

