

養胃散

【成分】

有效成分及含量：每 1 公克中含

Sodium bicarbonate(重曹).....254mg、Glycyrrhiza(甘草).....254mg、
Magnesium carbonate(碳酸鎂)...254mg、Cinnamon(桂皮).....136mg

其他成分(賦形劑)：Menthol(薄荷)、Clove(丁香)、Ginger(生薑)。

【用途(適應症)】胃痛、嘔吐、消化不良、胃酸過多、食慾不振。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3 歲以下。
 2. 消化道潰瘍的人。
 3. 有腎臟疾病的人。
 4. 須限鹽飲食的人。
 5. 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 與其他藥品併用時。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
 5. 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
 6. 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
 7. 可能引起腹脹、打嗝。

【用法用量】

年齡	使用量
成人	每次 1 匙 (1 匙約 1gm)
8 歲-15 歲	適用成人劑量之 1/2 量
4 歲-7 歲	適用成人劑量之 1/3 量
每日 3 次，飯後以開水服用。	

【警語】

●服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

●服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】6~1000 公克 PE 塑膠瓶裝。

【儲存】儲存於 25°C 以下。

【類別】成藥。

委託者：華興化學製藥廠股份有限公司
地址：彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號
製造廠：光南製藥股份有限公司宜蘭廠
地址：宜蘭市黎明二路 240 號

