"濟生"

甘油浣腸液 500毫克/毫升

Glycerin enema 500mg/ml "Chi Sheng"

成分：Each ml contains：

Glycerin…… 500mg

【適應症】:緩解便祕。

【用法用量】:

將一劑注入直腸內，若未見效果時可再注入一劑，一天最多可使用二劑。成人每劑20ml(1粒)，6歲以上適用成人劑量；3歲以上未滿6歲，每劑10ml(1/2粒)；未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。使用時應注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。使用後之剩餘液需丟棄，不宜留存。

【注意事項】:

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

五、浣腸劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得使用連續一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】:

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。

二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。

三、禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。

四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。

五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。

六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。

八、會造成直腸刺激感、腹部不適。

【包　　裝】：2～25粒塑膠容器裝(每粒20毫升)。

【儲存條件】：請置於25℃以下陰涼處保存之。

衛署成製字第009037號

CHI SHENG

濟生化學製藥廠股份有限公司
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION
新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號
電話：(03)5983811